

การเฝ้าระวังการระบาดวิทยา จังหวัดน่าน


เดือน กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบาดวิทยา

จังหวัดน่าน 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2566

Disease อัตราป่วยต่อแสนประชากร



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี


จังหวัดน่าน เดือน กุมภาพันธ์ 2566

โรค	2561	2562	2563	2564	2565	Median	2566
Food Poisoning	80	88	101	100	57	88	126
Influenza	143	398	226	27	16	143	152
Malaria	1	0	0	0	1	0	1
Leptospirosis	0	4	1	0	1	1	2
Melioidosis	0	0	2	1	1	1	2


สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน กุมภาพันธ์ 2566

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566



Food Poisoning พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยกระจายในทุกอำเภอ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอภูเพียง** แต่ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

****มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่**

อำเภอบ้านหลวง พบผู้ป่วยจำนวน 12 ราย (รับประทานลาบแก้งดิบ) ต.บ้านพี

อำเภอนาหมื่น พบผู้ป่วยจำนวน 18 ราย ต.ปิงหลวง (ใน รร.) ผล Lab ไม่พบ Bacteria

สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี
จังหวัดน่าน เดือน กุมภาพันธ์ 2566


Malaria พบผู้ป่วยที่ บ้านปางหก ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 1 ราย
อัตราป่วยเท่ากับ 0.21 ต่อแสนประชากร
ดำเนินการควบคุมโรคในพท. ปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม

Leptospirosis พบผู้ป่วยที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อัตราป่วยเท่ากับ 20.80 ต่อแสนประชากร


Melioidosis พบผู้ป่วยที่ อำเภอท่าวังผา
อัตราป่วยเท่ากับ 1.79 ต่อแสนประชากร

ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ

ร้อยละ



1 กุมภาพันธ์ – 27 กุมภาพันธ์ 2566




ควบคุม-กำกับ-ติดตาม : การเฝ้าระวัง สอบสวนและรายงานโรคต่อทางระบาดวิทยา (ระบบรายงาน 506)

จำนวนบัตรในการส่งรายงาน 506 เปรียบเทียบ 43 แพ้ม จำแนกรายอำเภอ

1 มกราคม – 31 มกราคม 2566

ร้อยละ



ควบคุม-กำกับ-ติดตาม : การเฝ้าระวัง สอบสวนและรายงานโรคต่อทางระบาดวิทยา (ระบบรายงาน 506) และ 43 แพ้ม HDC



สถานการณ์โรคติดต่อสำโดยแมลง พ.ศ. 2566 จำแนกรายพื้นที่

กองโรคติดต่อสำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

● ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2566

โรคไข้เลือดออก

จำนวนป่วย (ราย) 5,449
จำนวนเสียชีวิต (ราย) 2
จำนวนจังหวัด 73

CLICK HERE

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

จำนวนป่วย (ราย) 30
จำนวนเสียชีวิต (ราย) 0
จำนวนจังหวัด 3

CLICK HERE

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

จำนวนป่วย (ราย) 253
จำนวนเสียชีวิต (ราย) 0
จำนวนจังหวัด 14

CLICK HERE

โรคไข้มาลาเรีย

จำนวนป่วย (ราย) 1,430
จำนวนเสียชีวิต (ราย) 0
จำนวนจังหวัด 37

CLICK HERE

โรคสครับไทฟัส

จำนวนป่วย (ราย) 477
จำนวนเสียชีวิต (ราย) 0
จำนวนจังหวัด 39

CLICK HERE



จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)
กรุงเทพมหานคร	1,317
สงขลา	358
สมุทรปราการ	318



จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)
กรุงเทพมหานคร	28
นนทบุรี	1
ระยอง	1



จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)
กรุงเทพมหานคร	226
ชลบุรี	5
ชัยภูมิ	4



จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)
ตาก	967
แม่ฮ่องสอน	159
กาญจนบุรี	86



จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)
เชียงราย	86
เชียงใหม่	62
แม่ฮ่องสอน	48

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

1 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2566


อัตราป่วยไข้เลือดออก ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2565

ศูนย์ระบาดวิทยา สสจ.น่าน ได้รับรายงาน

ผู้ป่วย **โรคไข้เลือดออก** จำนวน 25 ราย(อัตราป่วย 5.26)

- อ.สองแคว 13 ราย (อัตราป่วย 109.15)
- อ.ท่าวังผา 6 ราย (อัตราป่วย 11.84)
- อ.ทุ่งช้าง 2 ราย (อัตราป่วย 11.01)
- อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย (อัตราป่วย 10.14)
- อ.เมืองน่าน 8 ราย (อัตราป่วย 9.89)
- อ.เชียงกลาง 2 ราย (อัตราป่วย 7.18)
- อ.ปัว 4 ราย (อัตราป่วย 6.20)
- อ.ภูเพียง 2 ราย (อัตราป่วย 5.60)

ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต




สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


1 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกรายเดือน จ.น่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง


จำนวนผู้ป่วย(ราย)



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตามกลุ่มอายุ
จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566



ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2566

อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย							ผลรวม ทั้งหมด
	0	1	2	3	5	6	7	
อ.เฉลิมพระเกียรติ								1
ด.ขุนน่าน								1
บ.กิวจันทร์				1				1
อ.เชียงกลาง								2
ด.พระพุทธบาท								2
บ.ดีด	1					1		2
อ.ท่าวังผา								6
ด.ผาดอ								5
บ.สบเป็ด	3	1	1					5
ด.ยม								1
บ.ก่ง	1							1
อ.ทุ่งช้าง								2
ด.ปอน								1
บ.เฉลิมราช						1		1
ด.และ								1
บ.ทุ่งอ้าว						1		1

อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย							ผลรวม ทั้งหมด
	0	1	2	3	5	6	7	
อ.ปัว								4
ด.ปัว								1
บ.ซอน			1					1
ด.ป่ากลาง								3
บ.น้ำเป็น	1							1
บ.สวนทราย	2							2
อ.ภูเพียง								2
ด.ฝายแก้ว								2
บ.บุปผาราม	1							1
บ.ห้วยคำ						1		1

อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย							ผลรวม ทั้งหมด
	0	1	2	3	5	6	7	
อ.เมืองน่าน								8
ด.ในเวียง								2
บ.น้ำล่อม	1							1
บ.พระเกิด		1						1
ด.สวก								1
บ.ป่าคา	1							1
ด.สะเนียน								5
บ.กลางพัฒนา				1				1
บ.ปางเป๋ย				2				2
บ.ใหม่เจริญสุข	2							2
อ.สองแคว								13
ด.นาไร่หลวง								13
บ.ถ้ำเวียงแก	1				1	1		3
บ.ผาหมี่		1	1	1	1	4	2	10
ผลรวมทั้งหมด	14	3	3	5	2	9	2	38



กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ 88/1 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2653-4444 ต่อ 4162

ปศุสัตว์แจ้งเตือนหวัดนกระบาดในเวียดนาม

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากรายงานข่าวจาก ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ว่ากระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาออกแถลงการณ์ยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิด A สายพันธุ์ H5N1

โดยผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงวัย 11 ปี เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 เด็กหญิงรายนี้เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยอาการไข้สูง ไอ และเจ็บคอ หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่น แล้วอาการไม่ดีขึ้น มีอาการหายใจติดขัดผิดปกติ ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเด็กแห่งชาติที่กรุงพนมเปญ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 แพทย์ทำการส่งตัวอย่างไปตรวจ และผลออกมาว่าผู้ป่วยเป็นเชื้อไข้หวัดนกชนิด H5N1 โดยผู้ป่วยเสียชีวิต

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกมาแล้วเป็นระยะเวลา 16 ปี แต่กรมปศุสัตว์ก็ยังคงเตรียมความพร้อม และป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาดงเยียมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังโรคสัตว์ความแนวชายแดนอย่างเข้มงวด สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่หนองพวย พื้นที่ท่งกวังไซ พื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น เป็นต้น เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ปีกภายในประเทศ ซะลอการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ปีกจากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนก ส่วนสัตว์ปีกเลี้ยงในระบบฟาร์มให้เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูงสุด เช่น การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเข้มงวดเรื่องระบบความปลอดภัยภายในฟาร์ม ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์ม ให้ฉีดพ่นยานพาหนะทุกคัน เป็นต้น รมรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ได้แก่ พื้นที่หนองพวยอาศัยอยู่ พื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น เป็นต้น ตลอดจนผลักดันระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าระบบมาตรฐาน GAP หรือ GFM รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกสังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อย่างนำสัตว์ปีกไปจำหน่ายแจก หรือนำไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการมาตรการ ควบคุมโรคทันที หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 063-225-6888 หรือแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลาอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่ที่สุด



22 กพ.66 ประเทศกัมพูชา
พบ ผู้ป่วยไข้หวัดนก 2 ราย
เสียชีวิตแล้ว 1 ราย

โรคไข้หวัดนก Avian Influenza



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



อาการ

มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
อ่อนเพลีย มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ

การติดต่อ

ติดต่อได้จากการสัมผัสสัตว์ป่วย
เช่น สารคัดหลั่งจากสัตว์ อุจจาระ
น้ำมูก น้ำตา น้ำลายสัตว์ที่ป่วย

คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป

1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่
2. งดกินเนื้อไก่ที่เป็นที่กึ่งสุกกึ่งดิบ
3. ไข่ไก่เลือกฟองที่สดใหม่และไม่มีมูลไก่ติดเชื้อไข่
4. เนื้อไม่ควรมีสีคล้ำ
5. ถ้าซื้อไก่เป็น ไม่ซื้อไก่ที่ซึม หงอย ขนฟู หน้าหรือหงอนบวมคล้ำ มีน้ำมูก

คู่มือการปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)



โดย คณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนก (ฉบับปรับปรุง)

ไข้หวัดนก (Avian influenza)

ICD-10: J09

1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค (Case definition for surveillance)

1.1 เกณฑ์ทางคลินิก (Clinical criteria)

มีไข้ (มากกว่าหรือเท่ากับ 38 องศาเซลเซียส) และมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ หายใจ
ผิดปกติ (หอบเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก) ร่วมกับมีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- ช่วง 14 วันก่อนป่วย ได้มีการสัมผัสกับสัตว์ปีก
- ช่วง 14 วันก่อนป่วย ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ปีกตายมากผิดปกติ หรือพบเชื้อในสัตว์ปีกหรือสิ่งแวดล้อม
- ช่วง 14 วันก่อนป่วย ได้อาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้หวัดนก
- ช่วง 14 วันก่อนป่วย ได้ดูแลหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เข้าข่ายหรือยืนยันไข้หวัดนก

จับตา...เฝ้าระวัง ไข้หวัดนก



เฝ้าระวังสถานการณ์

ติดตามสถานการณ์โรค

ในพื้นที่ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง



เฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วย/ตาย

สังเกตอาการสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ นก เป็ด ห่าน และเฝ้าระวังนกอพยพย้ายถิ่น



เฝ้าระวังอาการป่วย

สังเกตอาการป่วยของตนเอง และคนในครอบครัว ร่วมกับมีประวัติการสัมผัส สัตว์ปีกที่ป่วยตาย ให้รีบพบแพทย์ทันที



เฝ้าระวังการกิน

อาหารควรปรุงสุกด้วยอุณหภูมิ ไม่ต่ำกว่า 70 องศา ไม่กินสัตว์ปีกที่ตาย แบบไม่ทราบสาเหตุ



"กินร้อน, ช้อนกลาง
ล้างมือ"

อัปเดต กุมภาพันธ์ 2566



แนะผู้ที่สัมผัสสัตว์ปีก เลือก : เลี่ยง : ล้าง เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก



เลือกซื้อ

ไม่ควรซื้อสัตว์ปีกที่มีกลิ่น เมื่อ ก เนื้อที่มีสีเขียวคล้ำ เนื้อสัตว์ต้องมีความ ยืดหยุ่น กดแล้วไม่ทิ้งรอยบุ๋มไว้ หนังใส หน้งและเนื้อติดกันแน่น



หลีกเลี่ยง

การใช้เขียงหั่นอาหารสด ผัก หรือผลไม้ อาหารปรุงสุก ร่วมกัน



ล้าง

หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดบ่อยๆ



หลีกเลี่ยง

การซื้อหรือสัมผัสสัตว์ปีก ที่ตายไม่ทราบสาเหตุ มีลักษณะ เนื้อมีสีคล้ำ มีจุดเลือดออก



หลีกเลี่ยง

การใช้มือหรืออุปกรณ์ที่เปื้อนจาก การสัมผัสเนื้อสัตว์ปีก เช่น ผักก้นเปื้อน มาสัมผัสจมูก ตา และปาก

4 หน้า 17 มกราคม 2566

อ้างอิง : หนังสือชุดความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค



เหตุการณ์ 12 มกราคม 2566 ผู้เสียชีวิตมี
ภูมิลำเนาอยู่ที่
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ปัจจุบัน จ.น่าน พบผู้ป่วย 2 ราย



“โรคหูดับ” จ.น่าน พบเสียชีวิตแล้ว 1 คน



พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ

กินหมูดิบ เสี่ยงหูดับ

รายสัปดาห์

ฉบับที่ 6/2566

วันที่ 19 - 25 ก.พ. 66



เกิดจากหมูที่ป่วย



สถานการณ์ 1 พ.ค. - 11 ก.พ. 66

โรค ไข้หูดับ

พบผู้ป่วย 19 ราย

เสียชีวิต 1 ราย

พบมากในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร, ทำงานบ้าน



ติดเชื้อได้จาก....



บาดแผล
รอยถลอก แสบพุตา



กินเนื้อหมู/เลือด
ที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ



สัมผัสกับหม
เนื้อหมูที่ติดเชื้อ

อาการ

เริ่มมีอาการหลังรับเชื้อ
โดยเฉลี่ยใน 3 วัน

- ไข้สูง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
- ปวดเมื่อยตามตัว ตามข้อ
- มีจ้ำเลือดตามตัว ตามผิวหนัง
- ชีพ คอแข็ง ชัก

หากเชื้อลุกลามไปยัง
ส่วนปลายประสาทรับเสียง
สามารถทำให้หูตึงไปจนถึงหูหนวกได้

ร้อยละ
40



ผู้ติดเชื้อ
สูญเสีย
การได้ยินถาวร



อาการทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใน 14 วัน หลังเริ่มมีไข้ หากได้รับการรักษา อาจเสียชีวิตได้

การป้องกัน



เลี่ยงการกินหมูดิบ
หรือสุก ๆ ดิบๆ



แยกภาชนะ อุปกรณ์ สำหรับ
อาหารดิบและสุกออกจากกัน








ผู้ที่เลี้ยง/ทำงานใกล้ชิดหมู
ควรใส่เสื้อผ้าปิดชิด รองเท้า ถุงมือ



ร้านจำหน่าย
เนื้อหมูที่ได้มาตรฐาน







สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

สถานการณ์โควิด 19

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

สถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (สัปดาห์ที่ 8)

(สะสม) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2566

20 – 26 มกราคม 2566

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ + 20 ราย

อัตราป่วย 179.1 ต่อแสนประชากร

ผู้ติดเชื้อสะสม 1 ม.ค.66 เป็นต้นมา 854 ราย

เสียชีวิต สัปดาห์นี้ 0 ราย

อัตราป่วยตาย 0.00 (ร้อยละ)

เสียชีวิตสะสม 1 ม.ค.66 เป็นต้นมา ราย 0

อยู่ระหว่างรักษา 26 ราย

ผู้ป่วยใน ราย 2

ผู้ป่วยนอก 24 ราย

เขียว

เหลือง


แดง

24 ราย

2 ราย


0 ราย

แผนที่สถานการณ์ใน 7 วัน



แนวโน้มผู้ติดเชื้อสะสม จำแนกรายสัปดาห์

จำนวน (ราย)



บทสรุปและมาตรการ โควิด 19 จังหวัดน่าน

หลังประกาศเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน

วิเคราะห์สถานการณ์ :

ผู้ติดเชื้อ

: แนวโน้มผู้ติดเชื้อ ลดลงอย่างต่อเนื่อง, ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 60 – 69 ปี และ 50 -59 ปี, 90% ติดเชื้อไม่แสดงอาการ หรือ มีอาการเพียงเล็กน้อย

การระบาด

: ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ในพื้นที่จังหวัดน่าน

มาตรการป้องกัน :

เร่งรัด

: **Universal Vaccination** เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในทุกเข็ม โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นเพื่อลดอาการป่วยหนัก และ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ ก่อนเทศกาลสงกรานต์

เน้นย้ำ

: มาตรการ **D-M-H-T** โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม ยังคงให้ประชาชนปฏิบัติ ดังนี้

- (1) **D; Distancing** เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และควรเลี่ยง อยู่ใกล้ชิดกันในสถานที่แออัด
- (2) **M; Mask** ควรสวมตลอดเวลาโดยเฉพาะขณะอยู่ในสถานที่ปิด, โดยสาธารณะ, กิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก
- (3) **H; Hand washing** หมั่นล้างมือบ่อยๆ เพราะมีโอกาสนำมือมาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัว
- (4) **T; Testing** ตรวจ หรือทดสอบการติดเชื้อด้วย ATK เมื่อ มีอาการป่วย หรือสงสัยติดเชื้อ

การเฝ้าระวัง

: กลุ่มก้อน ≥ 5 ราย ให้สอบสวนการระบาด + ส่งตรวจ PCR(กรณี ≥ 10 ราย) + เฝ้าระวังสายพันธุ์

: เสียชีวิต ให้สอบสวนโรค(Novel 3) ส่งตรวจ PCR + สายพันธุ์ (ทุกราย)



ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ **26 กุมภาพันธ์ 2566 (16.00 น.)** ทีม Vaccine NAN กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ร้อยละผู้ได้รับวัคซีนทุกชนิด

ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ **26 กุมภาพันธ์ 2566 (16.00 น.)** ทีม Vaccine NAN กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ร้อยละผู้ได้รับวัคซีนทุกชนิด



ผลการให้บริการ LAAB

- รพ.น่าน 121 โดส(LAAB คงคลัง 327 โดส)
- รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว 118 โดส (LAAB คงคลัง 82 โดส)
- รพ.สา 9 โดส อยู่ในระหว่างวางแผนจัด (LAAB คงคลัง 191 โดส)
- รวม จ.น่าน : 248 ราย (29%) (คงคลัง 600โดส) (71%)

949,754 โดส

ปชก.เป้าหมาย MOPH IC 429,265 ราย

เข็ม1	เข็ม2	เข็ม3
79.81%	79.04%	54.62 %
(42,938 โดส)	(42,522 โดส)	(29,386โดส)

(เป้าหมายวัยเจริญพันธุ์ รวม 53,797 ราย)

เริ่มชีวิต 18 ตุลาคม 2565
(เป้าหมายทั้งหมด 17,518 ราย)

เพิ่ม 1
2.89 %

เพิ่ม 2
1.96 %

เพิ่ม1
91.76%

(115,134 โดส)

เพิ่ม 2
90.21%

(113,188 โดส)

ເປັນ 3 65.87%

เพิ่ม 3 เทียบเพิ่ม 2
72.67%

(82,649 โดส)

(จำนวนเป้าฯ 125,467 ราย)

เพิ่ม 3 2,262 โดส

เพิ่ม1
79.32%

เพิ่ม 2
60.57%

เพิ่ม3
7.3 %

เป้า
ทั้งหมด

31,043 ราย

เพิ่ม 3 14,505 โดส

(เป้า ทั้งหมด 32,526 ราย)

เพิ่ม1
85.61%

เพิ่ม 2
87.34%

ເພີ່ມ 3
44.59%