

การเฝ้าระวังการระบาดของวิทยา จังหวัดน่าน


เดือน มีนาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบบทางวิทยา

จังหวัดน่าน 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2566


Disease อัตราป่วยต่อแสนประชากร



10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบบทางวิทยา

จังหวัดน่าน 1 - 30 มีนาคม 2566

Disease อัตราป่วยต่อแสนประชากร



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี


จังหวัดน่าน เดือน มีนาคม 2566

โรค	2561	2562	2563	2564	2565	Median	2566
Pyrexia	328	478	357	297	310	328	333
Influenza	124	250	167	53	3	124	142
Food Poisoning	66	106	87	69	40	69	133
Melioidosis	1	3	0	0	2	1	6
Leptospirosis	1	5	3	0	0	1	3


สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน มีนาคม 2566

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Pyrexia จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Pyrexia จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566





Pyrexia พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอสองแคว** แต่ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Pyrexia จำแนกรายเดือน อ.สองแคว จ.น่าน เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน มีนาคม 2566




Influenza พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอภูเพียง** แต่ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน




สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน มีนาคม 2566

อัตราป่วยต่อแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 - 30 มีนาคม 2566



อัตราป่วยต่อแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จำแนกตามพื้นที่ อำเภอขนาดเล็ก จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 - 30 มีนาคม 2566




Food Poisoning พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอนาน้อย**

- พบ **มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน** ที่ในงานอุปสมบท **ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย** จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น ผู้ป่วยมีอาการถ่ายเหลว ปวดท้อง มีไข้ อาเจียนเล็กน้อย เข้ารับการรักษาที่ รพ.สต.บัวใหญ่ และรพ.น่าน้อย 34 ราย
- ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบเชื้อ
- เมนูเสี่ยง ลาบหมูดิบ ตำมะม่วง

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Food Poisoning จำแนกราย


สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน มีนาคม 2566




Melioidosis
พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด
คือ **อำเภอสันติสุข**
แต่ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

Leptospirosis
พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด
คือ **อำเภอเฉลิมพระเกียรติ**
แต่ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน




ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ

1 มกราคม - 30 มีนาคม 2566



1 - 30 กุมภาพันธ์ 2566



ควบคุม-กำกับ-ติดตาม : การเฝ้าระวัง สอบสวนและรายงานโรคต่อทางระบาดวิทยา (ระบบรายงาน 506)



สถานการณ์โรคติดต่อสำโดยแมลง ประเทศไทย พ.ศ. 2566

กองโรคติดต่อสำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 24 มีนาคม 2566

จำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อสำโดยแมลง

11,718

จำนวนจังหวัดที่รายงาน

76

จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต

10

ไข้เลือดออก

8,625

(เพิ่ม 934 ราย)

ไข้ซิกา

36

(เพิ่ม 1 ราย)

ไข้ปวดข้อยุงลาย

338

(เพิ่ม 19 ราย)

ไข้มาลาเรีย

1,963

(เพิ่ม 201 ราย)

สครับไทฟัส

756

(เพิ่ม 66 ราย)

เท้าช้าง


1

(เพิ่ม 0 ราย)

ลิ้นมาเนย์

0

(เพิ่ม 0 ราย)





สถานการณ์โรคติดต่อฯ โดยแมลง พ.ศ. 2566 จำแนกรายพื้นที่

กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 24 มีนาคม 2566

โรคไข้เลือดออก

จำนวนป่วย (ราย) 8,625
จำนวนเสียชีวิต (ราย) 8
จำนวนจังหวัด 75

CLICK HERE




แผนที่แสดงข้อมูลการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยกำหนดในการใช้งาน

จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)
กรุงเทพมหานคร	1,801
สงขลา	610
สมุทรปราการ	485

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

จำนวนป่วย (ราย) 36
จำนวนเสียชีวิต (ราย) 0
จำนวนจังหวัด 5

CLICK HERE



แผนที่แสดงข้อมูลการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยกำหนดในการใช้งาน

จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)
กรุงเทพมหานคร	32
ระยอง	1
นนทบุรี	1

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


1 มกราคม - 30 มีนาคม 2566

ศูนย์ระบาดวิทยา สสจ.น่าน ได้รับรายงาน
ผู้ป่วย **โรคไข้เลือดออก** จำนวน **95** ราย
(อัตราป่วย 19.98)

- อ.สองแคว 67 ราย (อัตราป่วย 562.50)
- อ.ท่าวังผา 6 ราย (อัตราป่วย 11.84)
- อ.ทุ่งช้าง 2 ราย (อัตราป่วย 11.01)
- อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย (อัตราป่วย 10.14)
- อ.เมืองน่าน 8 ราย (อัตราป่วย 9.89)
- อ.เชียงกลาง 2 ราย (อัตราป่วย 7.18)
- อ.ปัว 4 ราย (อัตราป่วย 6.20)
- อ.ภูเพียง 2 ราย (อัตราป่วย 5.60)




ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อัตราป่วยไข้เลือดออก ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2565



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

1 - 30 มีนาคม 2566



จำนวนผู้ป่วยใช้เลือดออกจังหวัดน่านรายสัปดาห์จำแนกตามหมู่บ้าน

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2566

อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย				ผลรวม ทั้งหมด
	9	10	11	12	
อ.เมืองน่าน					10
ด.ในเวียง					3
บ.หัวเวียงใต้	1				1
ด.ผาสิงห์					1
บ.ดอนสวรรค์		1			1
อ.สองแคว					67
ด.ชนแดน					29
บ.น้ำป่าน	8	3	6	2	22
บ.วังเส้า	1	1			2
บ.ห้วยมอย	1				1
บ.ห้วยเลา		1			1
ด.ใหม่ชัยแดน					3
บ.นาไร่หลวง	7	2	2		37
บ.ถ้ำเวียงแก	1	1	1		8
บ.ผาหมี	5	1	1		28
บ.หางทุ่ง	1				1
ด.ยอด					1
บ.ผาหลัก		1			1
ผลรวมทั้งหมด	18	12	8	2	95

สรุปผลสำรวจลูกน้ำยุงลายสัปดาห์ที่ ประจำสัปดาห์ที่ 12 (19 มี.ค.- 25 มี.ค.66) จ.น่าน รายอำเภอพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกสีแดง สีเหลือง เฉพาะจุด บ้าน วัด โรงเรียน															
ชื่ออำเภอ	จน.ครัวเรือน	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	ค่าHI บ้าน	จน.วัด	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	% การพบลูกน้ำวัด	จน.โรงเรียน	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	% การพบลูกน้ำโรงเรียน
เมืองน่าน	29696	7715	25.98	50	0.65	79	79	100.0	0	0.00	54	21	38.9	2	9.52
ปัว	18029	846	4.69	0	0.00	60	12	20.0	0	0.00	44	2	4.5	0	0.00
ท่าวังผา	14973	NA	NA	NA	NA	57	57	100.0	0	0.00	42	NA	NA	NA	NA
ภูเพียง	10210	NA	NA	NA	NA	35	NA	NA	NA	NA	13	NA	NA	NA	NA
เวียงสา	22532	NA	NA	NA	NA										

มาตรการควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชน : มาตรการ 3-3-1-7-14-21-28

กรณีพบผู้ป่วยรายแรกๆ ของหมู่บ้าน ให้ควบคุมโรค โดยมีเป้าหมาย

- Day 7: ดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI และ CI ในรัศมี 100 เมตรจากบ้านผู้ป่วยเป็นศูนย์
- Day 14: HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 5
- Day 21 : HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 5 CI ของรพ./โรงเรียน/วัด/โรงแรม/โรงงาน ในตำบล=0



หมายเหตุ

- คงมาตรการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนทุก 7 วัน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
- คงมาตรการฟันสารเคมีเสริมทุก 7 วันหากยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง
- ถ้าพบผู้ป่วยตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปใน 28 วันในกลุ่มบ้าน / หมู่บ้านเดียวกัน ให้ฟันสารเคมีทั้งกลุ่มบ้าน/หมู่บ้านนั้นๆ เพิ่มเติมจากรัศมี 100 เมตร



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ

รายสัปดาห์

ฉบับที่ 1/2566
วันที่ 8 - 14 ม.ค. 66

ระวัง ! อาหารเป็นพิษ

ปี 2565 มีผู้ป่วยที่เป็นโรคอาหารเป็นพิษ
ถึง 70,010 ราย แต่ยังไม่มียุติชีวิต
สาเหตุจาก การกินอาหารที่อุณหภูมิเย็นและไม่ได้อุ่นซ้ำ

ในช่วงเดือน มกราคม นี้ มีทั้งวันเด็ก และ
เทศกาลตรุษจีนซึ่งมีความเสี่ยงที่เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้
จากกิจกรรมการจัดเลี้ยง
และการแจกจ่ายอาหาร
รวมทั้งขนม

อาการ



6 มาตรการ

ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน



1 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

- เลือก-ปรุงอาหารและน้ำดื่ม
สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
- ล้างมือ-ล้างจานและน้ำดื่ม
ด้วยสบู่และน้ำร้อนอย่างน้อย 1 นาที
- เก็บของอาหารที่ปรุงให้โรงเรียน
กับภาชนะที่ปิดสนิท (ระบุวัน เวลา)
ไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย 1 วัน
- ล้างมือและล้างจานด้วยน้ำร้อน
อย่างน้อย 60 ซม.
- ล้างมือและล้างจานด้วยน้ำร้อน
อย่างน้อย 60 ซม.
- ล้างมือและล้างจานด้วยน้ำร้อน
อย่างน้อย 60




ผลการดำเนินงานวัณโรค จังหวัดน่าน
ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2566 : กลุ่มที่ 1

ร้อยละ



เป้าหมายร้อยละ 90 (ในไตรมาสที่ 2)


กลุ่มเสี่ยง	เป้าหมาย	CXR	ร้อยละ	วินิจฉัย TB
1. ผู้สัมผัสใกล้ชิด(ผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2566)	329	329	100.0	1
2. ผู้สัมผัสใกล้ชิดย้อนหลัง ปี 2564-2565	971	921	95.0	2
3. ผู้ติดเชื้อ HIV	1,724	1,617	93.8	7
4. COPD อายุมากกว่า 60 ปี	1,707	1,567	91.8	4
5. CKD อายุมากกว่า 60 ปี	1,425	1,262	88.6	3
6. กลุ่มติดสุราในคลินิกบำบัด	389	341	87.7	4
7. DM อายุน้อยกว่า 60 ปี และ Un-control	3,177	2,733	86.0	6
8. HT อายุมากกว่า 60 ปี และ BMI < 18.5	4,579	3,848	82.2	6
9. DM อายุมากกว่า 60 ปี	8,662	7,024	81.0	11
รวมผลงานคัดกรอง	23,063	19,649	85.2	44

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2566 จำแนกรายอำเภอ

ผลการคัดกรอง CXR กลุ่มที่ 1


ร้อยละ

เป้าหมาย ร้อยละ 90 ในไตรมาส 2



ข้อมูลคัดกรอง ณ 25 มีนาคม 2566

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2566 : กลุ่มที่ 2




กลุ่มเสี่ยง	เป้าหมาย	CXR	ร้อยละ	วินิจฉัย TB
1. ผู้ต้องขังในเรือนจำ	1,253	1,253	100.0	10
2. บุคลากรสาธารณสุข	3,946	3,905	99.0	0
รวมผลงานคัดกรอง	5,199	5,158	99.2	10

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2566 จำแนกรายอำเภอ

ผลการคัดกรอง CXR กลุ่มที่ 2

เป้าหมาย ร้อยละ 100 ในไตรมาส 2


ร้อยละ



ข้อมูลคัดกรอง ณ 25 มีนาคม 2566

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2566 : กลุ่มที่ 3

ร้อยละ




กลุ่มเสี่ยง	เป้าหมาย	CXR	ร้อยละ	วินิจฉัย TB
1. สูงอายุ 60+ มี BMI < 18.5	4,113	2,999	73.0	28
2. กลุ่มดื่มสุราเรื้อรังในชุมชน	603	388	64.3	13
3. ผู้ป่วยติดเตียง	675	397	58.8	1
รวมผลงานคัดกรอง	5,391	3,784	70.2	42

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2566 จำแนกรายอำเภอ

ผลการคัดกรอง CXR กลุ่มที่ 3

ร้อยละ


เป้าหมาย ร้อยละ 90 ในไตรมาส 2



ข้อมูลคัดกรอง ณ 25 มีนาคม 2566

ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค จ.น่าน ปี 2566 (ผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซ้ำ)

ร้อยละผลงานการค้นหาและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค




ข้อมูล NTIP : ณ 25 มีนาคม 2566


ผลงานการค้นหาจำแนกรายอำเภอ

อำเภอ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
เมืองน่าน	117	70	59.8
ทุ่งช้าง	27	16	59.3
ท่าวังผา	72	25	34.7
สองแคว	18	6	33.3
ภูเพียง	51	1	

ผลงาน Treatment Coverage จ.น่าน ปี 2565 - 2566




TB Treatment Coverage ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 1 (รายจังหวัด)





ผลการค้นหาและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค จ.น่าน ปี 2566

(ณ 25 มี.ค. 66)



วิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงและช่วงอายุ ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา ปี 2566 จ.น่าน

กลุ่มอายุน้อยกว่า 60 ปี รวม 97 ราย (43.5%)

ประเภทกลุ่มเสี่ยง	จำนวน(ราย)
1.กลุ่มติดสุรา	21
2.ผู้ติดเชื้อ HIV	14
3. DM	9
4.ผู้สัมผัสใกล้ชิด	4
5.โรคที่ได้รับยากดภูมิ	3
6.ติดบ้าน ติดเตียง	2
7.ผู้ต้องขัง	8
8.CKD	1
9. COPD	1
10.ไม่มีความเสี่ยง	34

กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี รวม 126 ราย (56.5%)

ประเภทกลุ่มเสี่ยง	จำนวน(ราย)
1. สูงอายุ BMI < 18.5	44
2. DM	20
3. CKD	16
4. COPD	10
5. ติดสุรา	6
6. ติดบ้าน ติดเตียง	6
7. ผู้สัมผัสใกล้ชิด	5
8. โรคที่ได้รับยากดภูมิ	4
9. ผู้ติดเชื้อ HIV	2
10. ผู้ต้องขัง	2
11. ไม่มีความเสี่ยง	11

PA 66

ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ยื่นทะเบียนรักษา เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2566 (ณ วันที่ 25 มี.ค. 66)

จังหวัด	จำนวน ที่ใช้ประเมิน	Success		เสียชีวิต		โอนออก	ขาดยา	ล้มเหลว	กำลังรักษา
		ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ				
เชียงใหม่	256	-	-	23	8.9	14	3	1	215
เชียงราย	195	-	-	20	10.2	21	2	0	152
ลำปาง	166	-	-	20	12.0	14	1	0	131
พะเยา	97	-	-	8	8.2	11	0	0	78
แพร่	79	-	-	12	15.1	6	0	0	61
ลำพูน	62	-	-	6	9.7	1	0	0	55
น่าน	74	-	-	5	6.7	10	0	0	59
แม่ฮ่องสอน	31	-	-	3	9.7	3	0	0	25
รวมเขต	960	0	0	97	10.1	80	6	1	776

PA 66

ผลสำเร็จการรักษาวัณโรค ไตรมาส 1/66 จังหวัดน่าน (ข้อมูล NTIP 25 มี.ค. 66)

โรงพยาบาล	ขึ้นทะเบียนรักษา	รักษาสำเร็จ	เสียชีวิต	ขาดยา	ล้มเหลว	โอนออก	กำลังรักษา
รพ.น่าน	20		1				19
รพ.แม่จริม	1		1				
รพ.บ้านหลวง	3					2	1
รพ.นาน้อย	5		1			2	2
รพ.ร.ปัว	12					1	11
รพ.ท่าวังผา	5		1				4
รพ.เวียงสา	10		1			2	7
รพ.เชียงกลาง	4						4
รพ.ทุ่งช้าง	7						7
รพ.นาหมื่น	0						
รพ.สันติสุข	2						2
รพ.บ่อเกลือ	0						0
รพ.สองแคว	2						2
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	0						
รพ.ภูเพียง	3					3	
รวม	74		5(6.7%)			10(13.5%)	59(79.7%)

จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา(All form) ปี 2566 จำแนกรายโรงพยาบาล (ณ 25 มี.ค. 66)

โรงพยาบาล	จำนวนผู้ป่วย ขึ้นทะเบียน (ราย)	Success	กำลังรักษา	เสียชีวิต	ล้มเหลว	ขาดยา	โอนออก	RR /MDR
		จำนวน (ราย)	จำนวน (ราย)	จำนวน (ราย)	จำนวน (ราย)	จำนวน (ราย)	จำนวน (ราย)	จำนวน (ราย)
รพ.น่าน	76		71	3		0	2	
รพ.แม่จริม	6		2	2		0	2	
รพ.บ้านหลวง	5		2			0	3	
รพ.น่าน้อย	12		6	2		0	4	
รพร. ปัว	21		19			0	2	
รพ.ท่าวังผา	25		12	2		0	11	
รพ.เวียงสา	28		17	2		0	9	
รพ.เขียงกลาง	6		5			0	1	
รพ.ทุ่งช้าง	16		14	1		0	1	
รพ.นาหมื่น	2		2			0		
รพ.สันติสุข	4		3			0	1	

การจัดกลุ่มผู้ป่วยตาม Risk Score เพื่อลดการเสียชีวิตตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 1

โรงพยาบาล	ขั้นทะเบียน	ผู้ป่วยจำแนกตามประเภทกลุ่มเสี่ยง Risk Score (ราย)					
		High	เสียชีวิต	Intermediate	เสียชีวิต	Low	เสียชีวิต
รพ.น่าน	76	20	2	14	1	42	
แม่จรม	6	3	2	0		3	
บ้านหลวง	5	3		0		2	
นาน้อย	12	4	2	6		2	
ปัว	21	7		5		9	
ท่าวังผา	25	6	2	4		15	
เวียงสา	28	9	1	9	1	10	
เขียงกลาง	6	2		1		3	
ทุ่งช้าง	16	5	1	3		8	
นาหมื่น	2	0		0		2	
สันติสุข	4	1		1		2	
บ่อเกลือ	4	2		0		2	
สองแคว	6	3		2		1	
เฉลิมพระเกียรติ	1	0		0		1	
ภูเพียง	11	3	2	2		6	
รวม							

ผลการดำเนินงานตรวจวินิจฉัยโรคระยะแฝงโดย IGRA จ.น่าน

โรงพยาบาล	จำนวนผู้ป่วย B+ (ราย)	จำนวนผู้สัมผัสอายุ > 5 ปี (ราย)	ได้รับการ CXR		Dx.TB	เป้าเจาะ IGRA	ผลงานการส่งตรวจ IGRA		ผลการตรวจ IGRA		หมายเหตุ
			จำนวน (ราย)	ร้อยละ	ราย	(ราย)	จำนวน (ราย)	ร้อยละ	Positive	Negative	
รพ.น่าน	34	94	94	100	0	94	94	100	16	78	
รพ.แม่จริม	3	12	12	100	0	12	12	100	2	10	
รพ.บ้านหลวง	2	2	2	100	0	2	2	100	0	2	
รพ.นาน้อย	3	5	5	100	0	5	5	100	1	4	
รพร. ปัว	7	13	13	100	0	13	13	100	1	12	
รพ.ท่าวังผา	15	27	27	100	1	26	26	1			




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

สถานการณ์โรคโควิด 19

(สะสม) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 27 มีนาคม 2566


20 - 27 มีนาคม 2566

แผนที่สถานการณ์ใน 7 วัน



ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 จ.น่าน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย > 90%



บทสรุปและมาตรการ โควิด 19 จังหวัดน่าน

หลังประกาศเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง **ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน**

วิเคราะห์สถานการณ์

ผู้ติดเชื้อ

: แนวโน้มผู้ติดเชื้อ ลดลงอย่างต่อเนื่อง, ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ **50 - 69 ปี**
90% ติดเชื้อไม่แสดงอาการ หรือ มีอาการเพียงเล็กน้อย, ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ในพื้นที่จังหวัดน่าน

มาตรการป้องกัน

เร่งรัด

: **Universal Vaccination** เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคใน**ทุกเข็ม** โดยเฉพาะ**เข็มกระตุ้น**เพื่อลดอาการป่วยหนัก และ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ ก่อนเทศกาลสงกรานต์

เน้นย้ำ



มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน

ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน

- (1) เห็นชอบและให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อสำคัญในพื้นที่ จังหวัดน่าน ได้แก่
 - วัณโรค (การค้นหา / คัดกรอง / ขึ้นทะเบียน / ติดตาม-รักษาให้ครบคอส)
 - โรคไข้เลือดออก (สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ [3ก.] / ควบคุมโรค มาตรการ 3-3-1)
 - โรคไข้มาลาเรีย (การป้องกันโรคในพื้นที่เสี่ยง / การรักษา / การควบคุมโรคและแมลงพาหะนำโรค)
 - โรคมือ เท้า ปาก (การเฝ้าระวัง-คัดกรองใน รร. + ศพด. / การควบคุมโรค)
 - โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ (สื่อสารความเสี่ยง-แจ้งเตือน)
 - โรคไข้หัด (สื่อสารความเสี่ยง / การควบคุมแหล่งผลิต-จำหน่าย)
 - โรคโควิด 19 (มาตรการ D-M-H-T / การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น / เฝ้าระวังการระบาดเป็นกลุ่มก้อน)
- (2) เห็นชอบให้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในการป้องกันโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ ดังนี้
 - เน้นย้ำ / เร่งรัดการสร้างเสริม