



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

สถานการณ์ระบาดวิทยาและ ผลการดำเนินงานวัณโรค จังหวัดน่าน เดือน มิถุนายน 2566

ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด/อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 6/2566 วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมหม่อมเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน




สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน เดือน มิถุนายน 2566

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) สสจ.น่าน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบาดวิทยา

จังหวัดน่าน 1 - 30 มิถุนายน 2566

Disease อัตราป่วยต่อแสนประชากร




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี
จังหวัดน่าน เดือน มิถุนายน 2566

โรค	2561	2562	2563	2564	2565	Median	2566
Pyrexia	725	947	329	268	431	431	623
Food Poisoning	63	115	83	66	57	66	101
Influenza	136	118	17	4	13	17	68
HFMD	102	254	7	3	14	14	29
Leptospirosis	4	3	0	8	10	4	18
Mushroom poisoning	4	10	5	11	1	5	8


สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน มิถุนายน 2566


อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Food Poisoning จำแนกรายเดือน จ.น่าน เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน อ.น่าน้อย จ.น่าน



วันอาทิตย์ ที่ 25 มิ.ย. 66 ประชาชน น.3 บ้านขุนสถาน 12 คน หมู่ 9 บ้านแสนสุข 1 คน รวม 13 คน
รับประทานอาหารแฮมดิบที่ซื้อจากร้านค้าในหมู่บ้าน
ขุนสถานและแสนสุข ซึ่งต่างคนต่างซื้อไปรับประทาน
หลังรับประทาน มีอาการถ่ายเหลว คลื่นไส้อาเจียน

สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี



จังหวัดน่าน เดือน มิถุนายน 2566

Influenza พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอเวียงสา**
กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ **อายุ 0-4 ปี**

Pyrexia พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอสองแคว**




ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน




สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน มิถุนายน 2566


จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Leptospirosis จำแนกรายเดือน จ.น่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Leptospirosis จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Leptospirosis จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่
1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566




Leptospirosis พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอสันติสุข** และในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไปมากที่สุด มีแนวโน้มพบผู้ป่วย เพิ่มขึ้น


ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน เดือน มิถุนายน 2566


จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Mushroom poisoning จำแนกรายเดือน จ.น่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Mushroom poisoning จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Mushroom poisoning จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด น่าน
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566



Mushroom poisoning

พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด
คือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

16 มิ.ย.66 ผู้ป่วย 3 ราย รับประทานเห็ดพิษ (เห็ดเผาะมีราก)
อาศัยอยู่ ม.2 แสงดาว ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
ปัจจุบัน ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม



เห็ดพิษ (Mushroom poisoning)



เห็ดพิษ (Mushroom poisoning) พบมากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เห็ดหลายชนิดขึ้นเองตามธรรมชาติในป่า สวน ไร่ ทั้งเห็ดกินได้และเห็ดกินไม่ได้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมากโดยเฉพาะในระยะตูม จึงเกิดความเข้าใจผิด และนำเห็ดพิษมากิน ส่งผลให้ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น **ควรหลีกเลี่ยงการกินเห็ดที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดพิษ**

ตัวอย่าง ภาพเห็ดพิษและเห็ดกินได้

เห็ดพิษ



เห็ดกินได้



ปัจจัยเสี่ยงในการกินเห็ด



1. กินร่วมกับแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดพิษ เช่น เชื้อราโวกซิก



2. การกินเห็ดที่ไม่รู้จัก หรือไม่แน่ใจว่า กินได้หรือไม่



3. กินดิบๆ ทำให้เกิดพิษ เช่น เชื้อราโวกซิก



4. การต้มเห็ดร่วมกับ ข้าวสาร ข้าวหอม และ เครื่องเทศ แล้วไม่เปลี่ยนน้ำต้มเห็ดเป็นน้ำดื่มใหม่ เป็นอันตรายต่อชีวิต

เห็ดระโงกหินมีพิษถึงตาย ! *ความร้อนไม่สามารถทำลายพิษได้*

วิธีการตรวจสอบเห็ดพิษ (เห็ดระโงกหิน) ในเบื้องต้น โดยการผ่ากลางของเห็ดเห็ด หากมีลักษณะสีน้ำตาล แสดงว่าเป็นเห็ดพิษ และหากมีลักษณะกลางๆ แสดงว่าเป็นเห็ดกินได้ สังเกต



ลักษณะของเห็ดที่ควรหลีกเลี่ยง



อาการหลังกินเห็ดพิษ

เห็ดมีพิษไม่รุนแรง




คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว เกิดภายในไม่กี่นาทีแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ส่วนใหญ่หายเองได้เมื่อได้รับการรักษา

เห็ดมีพิษรุนแรง



ตับวาย ไตวาย ชักรุนแรงต่อเนื่อง หายใจถี่ และเสียชีวิตได้ เกิดอาการ 4 ชั่วโมงขึ้นไป หลังรับประทานเห็ด

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ลดการดูดซึมพิษ โดยให้ดื่มของดื่มน้ำจืด 50 g. ละลายน้ำเปล่า (ผงถ่านกัมมันต์ 1 g. ละลายน้ำจืด 1 g.) *ถ่านกัมมันต์ไม่สามารถใช้ได้


โดยทั่วไปไม่แนะนำให้กระตุ้นให้อาเจียน การอาเจียนมากเกินไปจะทำให้ความดันต่ำหรือระดับเกลือแร่ผิดปกติ และเสี่ยงต่อการเกิดเลือดจากการใช้โซดาและเกลือแร่ในช่องปาก (เพราะพิษจากเห็ดทำให้อาเจียนมากอยู่แล้ว)

อ้างอิง:


1. กองโรคพิษของพิษ ภาควิชาพิษวิทยา
2. คู่มือพิษวิทยาพิษวิทยา ภาควิชาพิษวิทยา
3. คู่มือพิษวิทยาพิษวิทยา ภาควิชาพิษวิทยา
4. คู่มือพิษวิทยาพิษวิทยา ภาควิชาพิษวิทยา
5. ภาควิชาพิษวิทยาพิษวิทยา ภาควิชาพิษวิทยา
6. ภาควิชาพิษวิทยาพิษวิทยา ภาควิชาพิษวิทยา

สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน เดือน มิถุนายน 2566

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Hand, foot and mouth disease จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด
น่าน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566




จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Hand, foot and mouth disease จำแนกรายเดือน จ.น่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




Hand foot and mouth disease
พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอแม่จริม**
และในกลุ่มอายุ **0-4 ปี**
มีแนวโน้มพบผู้ป่วย ลดลง

ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน




ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ

1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566



1 - 30 มิถุนายน 2566




ควบคุม-กำกับ-ติดตาม : การเฝ้าระวัง สอบสวนและรายงานโรคต่อทางระบาดวิทยา (ระบบรายงาน 506)



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566

ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 25



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค เขต และจังหวัด

ระดับพื้นที่: จั... (1) ▾

ภาค ▾

เขต ▾

จังหวัด ▾

ภาค	เขต	จังหวัด	ป่วยสะสม (ราย)	อัตราป่วย สะสม	ตายสะสม (ราย)	CFR สะสม (%)	ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)	อัตราป่วย 4 สัปดาห์ ล่าสุด	ตาย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)	CFR 4 สัปดาห์ล่าสุด (%)
กรุงเทพฯ	13	กรุงเทพมหานคร	2,954	53.15	1	0.03	138	2.48	0	0.00
ใต้	12	สงขลา	1,668	116.64	2	0.12	467	32.66	0	0.00
กลาง	6	ชลบุรี	1,127	71.54	2	0.18	300	19.04	0	0.00
กลาง	6	ระยอง	1,003	134.37	0	0.00	360	48.23	0	0.00
ตะวันออก...	10	อุบลราชธานี	916	49.05	0	0.00	365	19.54	0	0.00
เหนือ	1	เชียงใหม่	867	48.52	1	0.12	419	23.45	1	0.24
กลาง	6	จันทบุรี	794	148.12	2	0.25	353	65.85	0	0.00
กลาง	6	สมุทรปราการ	780	57.61	0	0.00	86	6.35	0	0.00
เหนือ	1	น่าน	736	154.52	0	0.00	295	61.94	0	0.00
กลาง	6	ตราด	694	303.78	0	0.00	299	130.88	0	0.00
กลาง	4	ปทุมธานี	651	55.02	3	0.46	45	3.8	0	0.00
ใต้	12	นราธิวาส	636	78.81	0	0.00	75	9.29	0	0.00
เหนือ	2	ตาก	572	84.94	0	0.00	218	32.37	0	0.00
ใต้	12	ปัตตานี	511	70.21	0	0.00	85	11.68	0	0.00
กลาง	5	สมุทรสาคร	492	83.89	0	0.00	31	5.29	0	0.00
เหนือ	1	เชียงราย	487	37.56	0	0.00	306	23.6	0	0.00

ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย) 0 467



ดาวน์โหลดรายชื่ออำเภอระบาด

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566

จัดทำโดย กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3133 Email: dvbdresponse@ddc.mail.go.th

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566


อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย(ราย)	อัตราป่วยต่อแสนประชากร
เมืองน่าน	34	41.88
แม่จริม	2	12.5
บ้านหลวง	0	0
น่าน้อย	6	18.35
ปัว	45	69.72
ท่าวังผา	61	120.39
เวียงสา	43	61.29
ทุ่งช้าง	131	721.25
เชียงกลาง	167	599.36
นาหมื่น	31	211.39
สันติสุข	4	25.38
บ่อเกลือ	1	6.76
สองแคว	454	3811.92
ภูเพียง	26	72.84
เฉลิมพระเกียรติ	4	41.6
รวม	1009	212.17



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

1 - 30 มิถุนายน 2566

แผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ล่าสุด จังหวัดน่าน จำแนกรายอำเภอ



**** พื้นที่ระบาด (Active Area) ****

อำเภอเชียงกลาง (ทุกตำบล)

อำเภอท่าวังผา (ตำบลตาลชุม, ตำบลผาตอ, ตำบลผาทอง, ตำบลแสนทอง)

อำเภอทุ่งช้าง (ตำบลปอน)

อำเภอนาหมื่น (ตำบลนาทะนุง, ตำบลบ่อแก้ว)

อำเภอปัว (ตำบลเจดีย์ชัย, ตำบลปากกลาง, ตำบลศิลาแลง)

อำเภอภูเพียง (ตำบลนาบึง)

อำเภอเมืองน่าน (ค่ายสุริยพงษ์ ต.ในเวียง)

อำเภอเวียงสา (ตำบลสันนาหนองใหม่)

อำเภอสองแคว (ทุกตำบล)

จำนวนผู้ป่วยใช้เลือดออกจังหวัดน่านรายสัปดาห์จำแนกตามหมู่บ้าน

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566

จำนวนผู้ป่วยใช้เลือดออกรายสัปดาห์ (4 สัปดาห์ล่าสุด) จังหวัดน่าน จำแนกรายหมู่บ้าน

พื้นที่อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์ที่เริ่มป่วย				
	21	22	23	24	25
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	2	1			
ตำบลขุนน่าน					
กิ่งจันทร์	1				
ตำบลห้วยโก๋น					
ห้วยโก๋น		1			
ห้วยทรายขาว	1				
อำเภอเชียงกลาง	27	26	35	21	18
ตำบลเชียงกลาง					
เจดีย์		2	4	2	1
เจดีย์ 2			2	4	4
เชียงโคม				1	
ตุ					1
ร่มไทร				1	
ตำบลเชียงคาน					
โหม่งเรียน	1	1	1		2
ตำบลเมือ					
น้ำอ้อ					1
รัชดา			1		
รัชดา 2					3
หนองแดง			2	2	1
หนองผุก	1				
ตำบลพญาแก้ว					
น้ำคา			3	2	
พุง			3	1	
ม่วง			1		
ตำบลพระธาตุ					
กลาง			1		
ดอนแก้ว	1	1	7	3	4
พริ้ว	1			1	
พวงพยอม	1				1
สร้อยพริ้ว	10	4	7	1	
ห้วยแก้ว	12	18	1		
ตำบลพระพุทธบาท					
ขาวาว			2		
ดัด					
เหล้า				2	
อ้อ				1	
ท่าวังผา	10	8	14	7	8
ตำบลจอมพระ					
ใหม่				1	
ตำบลศาลชุม					
ปง 1		1			
สมหนอง 2				1	1
ตำบลท่าวังผา					
ท่าวังผา 3					2
สนยาว					1
ตำบลผาแดง					
นาหนอง 2					1
แทน 2			1		1

พื้นที่อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์ที่เริ่มป่วย				
	21	22	23	24	25
หมู่บ้าน					
ตำบลผาทอง					
สันเจริญ					1
แทน 3	4	5	6		
แทน 1		1			
ตำบลแสนทอง					
ห้วยม่วง	6	1	7	5	1
อำเภอทุ่งช้าง	17	3	10	16	3
ตำบลลอบ					
ทุ่งสน				1	
ตำบลทุ่งช้าง					
ทุ่งช้าง	2				
ตำบลปอน					
เฉลิมราช	6		1	2	
น้ำเลียง	9	3	9	13	3
อำเภอนาน้อย		2	1	3	
น้ำตก					
พิชัยเจริญ				3	
พิชัยมงคล		2			
ตำบลศรีสะเกษ			1		
หนองบัว					
อำเภอนาหมื่น		8	9	12	2
ตำบลนาทะนุง					
น้ำเลา		1	2	5	1
หนองบัว		7	5	1	
หลักหมื่น				1	
ตำบลบ่อแก้ว					
โก่เถื่อน			1		
นายน			1	1	
นาหวาย				4	1
อำเภอบ่อเกลือ					1
ตำบลบ่อเกลือใต้					
นาเปรื่อง					1
อำเภอบัว	2	7	7	15	3
ตำบลแงง					
ดอนมูล				1	
ท่าล้อ			1		
ตำบลเจดีย์ชัย					
ทุ่งชัย		1	1	2	
น้ำก้อ		2		3	
ตำบลบัว					
ไร่รวงทอง				1	
ตำบลปากกลาง					
คางย้อ				2	
น้ำเป็น		1			
ปากกลาง	1		2		
สวนทราย	1	2	1	3	
ห้วยสะนาว			1		
ตำบลภูคา					
ผาเวียง		1			

พื้นที่อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์ที่เริ่มป่วย				
	21	22	23	24	25
ตำบลวรรณคร				1	
เกิด					
สวนดอก					1
ตำบลศิลาแลง					
คอนไชย			1		1
ห้วยดอย					1
ตำบลอวน					
คอนน้ำยาว				1	
ไร่				1	
อำเภอภูเพียง	2	3	4	5	4
ตำบลนาบึง					
น้ำลัด	1	1			
สันแก่น	1	1	3	4	3
ตำบลฝายแก้ว					
หนองเจริญ		1			
หัวเวียงเหนือ			1		
ตำบลเมืองจัน					
เมืองจันท์พัฒนา				1	
ใหม่สามัคคี					1
อำเภอเมืองน่าน	1	1	6	10	1
ตำบลกอกควาย					
ดอนเจริญ				1	
นาผา				1	
น้ำครกเก่า	1				
ตำบลไชยสถาน					
คำใหม่ไชยเจริญ				1	
ตำบลคูใต้					
เขาน้อย			1		
คูใต้					
ตำบลถ้ำดอง					
กัวป่าห้า				1	
ใหม่สุขสันต์		1		2	
ตำบลโนนเวียง					
ค่ายสุริยพงษ์			4	2	
ช้างเผือก			1		
พระนคร					1
มงคล				1	
ตำบลสะเนียน					
กาไส				1	
อำเภอแม่จริม			1	1	
ตำบลนาหาง					
น้ำดวง			1		
ตำบลแม่จริม					
ฝาย				1	
อำเภอเวียงสา	2	3	5	11	5
ตำบลกลางเวียง					
คอนไชย				1	
สถาน				1	
ตำบลมิ่ง					
วังงาม					1

พื้นที่อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์ที่เริ่มป่วย				
	21	22	23	24	25
ตำบลจอมจันทร์					
หล่มมื่นพราน			1		
ตำบลทุ่งศรีทอง	2				
ทุ่งทอง	2		1		
ทุ่งผง					
ตำบลนาเหลียง					
ป่าคา					1
ตำบลน้ำมวบ					
น้ำมี					1
ตำบลแม่ชะเนิง					
ห้วยนาเวียง		2	1		
ห้วยไฟตะเคียน	1				
ตำบลแม่สาคร					
สาคร					1
ตำบลล้าน					
ไผ่งาม					1
ตำบลล้านนาหนองไหม					
สันนาเคียน					1
สันนาหนองใหม่			2	6	2
อำเภอสองแคว	7	33	66	31	11
ตำบลขานแดน					
น้ำป่าน			1		
น้ำหล	1	5	10	4	
ปางก้อม			1		
วังเสา		3	7	1	2
สบพวง					
ห้วยเกลบล		1			1
ห้วยมอย					
ห้วยเลา			1		
ใหม่ชายแดน		6	9	4	1
ตำบลนาไร่หลวง					
ถ้ำเวียงแค	3	5	11	4	1
น้ำพัน					
ปางมุก		7	6	14	1
ปางไฮ	1				
ผาหมี่	1	3	7	1	3
วังไผ่		1		1	
สองแคว					
หางทุ่ง			1		
ใหม่			1		
ตำบลยอด					
ปางล้าน			1		1
ผาสึงห์					
ผาหลัก	1	2	10	1	2
ยอด					
อำเภอสันติสุข		1		2	1
ตำบลคูพงษ์					
ดอนคูพงษ์					1
น้ำโขง					1
ตำบลพงษ์					
ปางช้าง		1			
ผลรวมทั้งหมด	70	96	158	134	57

สรุปผลสำรวจลูกน้ำยุงลายสัปดาห์ที่ ประจำสัปดาห์ที่ 25 (18 - 24 มิ.ย.66) จ.น่าน รายอำเภอพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกสีแดง สีเหลือง เฉพาะจุด บ้าน วัด โรงเรียน															
ชื่ออำเภอ	จน.ครัวเรือน	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	ค่าHI บ้าน	จน.วัด	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	% การพบลูกน้ำวัด	จน.โรงเรียน	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	% การพบลูกน้ำโรงเรียน
เมืองน่าน	29696	8178	27.54	503	6.15	79	79	100.0	2	2.53	54	19	35.2	0	0.00
ปัว	18029	1315	7.29	38	2.89	60	13	21.7	0	0.00	44	2	4.5	0	0.00
ท่าวังผา	14973	7475	49.92	12	0.16	57	57	100.0	0	0.00	42	42	100.0	0	0.00
ภูเพียง	10210	7313	71.63	218	2.98	35	35	100.0	0	0.00	13	13	100.0	0	0.00
เวียงสา	22532	5568	24.71	186	3.34	78	78	100.0	0	0.00	66	11	16.7	1	9.09
นาน้อย	10233	7384	72.16	105	1.42	34	34	100.0	0	0.00	14	14	100.0	0	0.00
เฉลิมพระเกียรติ	2858	506	17.70	32	6.32	1	1	100.0	0	0.00	13	1	7.7	0	0.00
เขียงกลาง	8645	8455	97.80	133	1.57	37	37	100.0	0	0.00	26	26	100.0	0	0.00
สองแคว	3178	2770	87.16	65	2.35	9	9	100.0	0	0.00	12	12	100.0	0	0.00
แม่จริม	4414	1730	39.19	86	4.97	16	16	100.0	0	0.00	16	1	6.3	0	0.00
ทุ่งช้าง	6709	478	7.12	22	4.60	21	21	100.0	0	0.00	15	15	100.0	0	0.00
บ้านหลวง	3673	1354	36.86	31	2.29	12	12	100.0	0	0.00	8	8	100.0	0	0.00
สันติสุข	4420	3325	75.23	34	1.02	16	16	100.0	0	0.00	15	15	100.0	0	0.00
บ่อเกลือ	4205	3541	84.21	81	2.29	8	8	100.0	0	0.00	15	15	100.0	0	0.00
นาหมื่น	4468	3348	74.93	168	5.02	17	15	88.2	0	0.00	18	18	100.0	3	16.67
รวม จ.น่าน	148507	62740	42.25	1714	2.73	474	431	90.9	2	0.46	388	212	54.6	4	1.89
		ความครอบคลุมการสำรวจ						หมายเหตุ**				เกณฑ์ ค่า HI			
		สูง	เกิน 80%					NA	ไม่ส่ง			สูงเกินปกติ	เกิน 5%		
		ปานกลาง	50-80%									ปกติ	น้อยกว่า 5%		
		ต่ำ	น้อยกว่า 50%												



มาตรการสำคัญ ในการดำเนินงานควบคุม โรคติดต่อ นำโดย ยุงลาย

มาตรการ

สำหรับเจ้าหน้าที่



3-3-1

ควบคุมโรคติดต่อ นำโดย ยุงลาย

"

มาตรการควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วย
โรคติดต่อ นำโดย ยุงลาย เมื่อได้รับแจ้ง
ควรดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทันที
ตามมาตรการ 3-3-1 และเฝ้าระวังโรค
ต่อเนื่อง 28 วัน ดังนี้

"



3

สถานพยาบาลแจ้ง รพ.สต. หรือสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ทราบว่าพบผู้ป่วยโรคติดต่อ
นำโดย ยุงลาย ภายใน 3 ชั่วโมง หลังผู้ป่วยได้รับ
การวินิจฉัย

3

รพ.สต. หรือสถานบริการสาธารณสุข ดำเนินการสอบสวนโรค
ควบคุมยุงพาหะโดยการฉีดพ่นสารเคมี (เช่น สเปรย์กระป๋อง)
และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบ้านผู้ป่วย ภายใน 3 ชั่วโมง
หลังได้รับแจ้งพบผู้ป่วย

1

หน่วยงานท้องถิ่น พ่นสารเคมีควบคุม
ยุงพาหะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ในบ้านผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตร รอบบ้าน
ผู้ป่วย ภายใน 1 วัน หลังได้รับแจ้งพบผู้ป่วย



มาตรการการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน 2566

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับสัปดาห์นี้ ได้แก่

1. ทุกสถานบริการติดตามรายงานจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ระดับสงสัย (suspected case) ตามระบบและเงื่อนไขการรายงานตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
2. สสอ.ทุกแห่ง กำกับติดตามการสุ่มสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ ระบาดให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด (HI=0 ติดต่อกัน 7 วัน หลังวันพบผู้ป่วยรายสุดท้าย)
3. สสจ./อบจ. ทุกจังหวัด ควรตรวจสอบและเตรียมความพร้อมเครื่องพ่น และสารเคมีกำจัดยุง ตัวแก่ในพื้นที่ ให้เพียงพอต่อการควบคุมโรค รวมถึงจัดตั้งหน่วยควบคุมยุงพาหะกลางของ จังหวัดที่มีความคล่องตัวและสามารถควบคุมโรคได้ครอบคลุมและทันเวลา
4. สถานพยาบาลแนะนำแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ว่าอาจป่วย เป็นไข้เลือดออกได้ หากเป็นไปได้ควรตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
5. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อกำจัด Potential Container ความถี่ตามความเหมาะสม
6. สสจ. และ รพ. เพิ่มการสื่อสารไปยังร้านขายยาและประชาชน ให้ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่

ข้อสั่งการ มาตรการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

การประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน
ครั้งที่ 1/ 2566 วันที่ 28 มิถุนายน 2566

1. อำเภอที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกอำเภอ ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคไข้เลือดออก ทุกอำเภอ และส่งรายงานการประชุมฯให้ สสจ.น่าน ทุกสัปดาห์
2. อำเภอที่ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก ให้เปิดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง (Operation Center : OC) กรณี โรคไข้เลือดออก และส่งรายงานการประชุมฯให้ สสจ.น่าน ทุกสัปดาห์
3. ให้ทุกอำเภอกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเชิงคุณภาพ (ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ทุกสถานบริการ ทั้งในและนอกสังกัดฯ)
4. ให้ทุกโรงพยาบาลทุกแห่ง ตรวจสอบความพร้อมในการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก(เน้นความไว) การรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก รวมทั้งระบบการให้คำปรึกษา และระบบการส่งต่อผู้ป่วย
5. โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยใน จำนวนไม่มาก ให้พิจารณา Admitted ผู้ป่วยไข้เลือดออกและ จัดเตรียมยาตากันยุง มุ้ง เพื่อใช้ในแผนกผู้ป่วยใน

จังหวัดน่าน เตือนระวัง! ไข้เลือดออกกระบาด



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งเตือนระวังโรคไข้เลือดออกกระบาด จากรายงานการเฝ้าระวังข้อมูลทางระบาดวิทยาจังหวัดน่านพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 สสจ.น่าน ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกรวม จำนวนทั้งสิ้น 970 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 203.97 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 548 ราย เพศชาย 422 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.30 : 1

นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่าจังหวัดน่าน คาดว่าจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาวะของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยพบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอความร่วมมือท่านช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ **3ก** ดังนี้

ไม่ให้ยุงกัด

- ใส่เสื้อผ้าสีอ่อน
- ไม่อยู่ในที่มืดอับชื้น
- ทายากันยุง/นอนกางมุ้ง

ไม่ให้ยุงเกิด

- เก็บน้ำ ควบคุม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้าน

ไม่ให้ยุงหากิน

- เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก
- เก็บรอบบ้าน ให้โล่งสะอาด ปราศจากขยะวัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้ ฯลฯ

3ก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก และหากบุคคลในครอบครัวของท่าน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก, ผู้สูงอายุ, อ้วน และผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือภาวะเสี่ยง เมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เช่น ไข้สูงโดยเฉียบพลัน 1-2 วัน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะอาเจียน มีผื่น จุดสีแดงขึ้นตามลำตัวแขน ขา ปวดใต้ชายโครงขวา หรือถ่ายอุจจาระดำ ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้านท่าน เพื่อรับการรักษาก็ถูกต้องต่อไป หากปล่อยทิ้งไว้ผู้ป่วยจะมีภาวะช็อก ไข้ลด มือเท้าเย็น ชีพจรเบาเร็ว จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ง่าย



นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

facebook



WEBSITE



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (Nan Provincial Public Health Office)

467 ม.5 ต.พาสังห์ อ.เมืองปาน จ.น่าน 55000 โทร.054-719623-6 โทรสาร 054-719623-6 ต่อ 254



ปลอดภัยจากไข้เลือดออก ด้วยภูมิปัญญาไทย



กะเพรา

ขี้จันทน์ไค้กลิ่น
นำไปวางตามมุมอับ
หรือบริเวณที่มียุง



ตะไคร้หอม

ทุบพอหยาบๆ ได้กลิ่นหอม
นำไปวางตามมุมอับ
หรือบริเวณที่มียุง



ยูคาลิปตัส

ขี้จันทน์ไค้กลิ่น
น้ำมันหอมระเหย
นำไปวางตามมุมอับ
หรือบริเวณที่มียุง



มะกรูด

หั่นผิวมะกรูด
นำไปวางตามมุมอับ
หรือบริเวณที่มียุง



โหระพา

ขี้ให้มกกลิ่นหอม
นำไปวางตามมุมอับ
หรือบริเวณที่มียุง



ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายสำเร็จรูป
สามารถซื้อตามร้านขายยาหรือร้านค้าทั่วไป



www.dtam.moph.go.th
Call Center 02 591 7007



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก @DTAM

ข้อมูลจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



มาทำสเปรย์สมุนไพร ไว้ไล่ยุงกันเถอะ

วัตถุดิบ/อุปกรณ์

1. ตะไคร้หอมหั่น 100 กรัม
2. ผิวมะกรูดหั่น 50 กรัม
3. การบูร 10 กรัม
4. เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ
แอลกอฮอล์ล้างแผล 1 ลิตร
5. ผ้าขาวบางขนาด 25x25 เซนติเมตร 1 ผืน
6. โหลแก้วพร้อมฝาปิด 1 โหล
7. ขวดสเปรย์

วิธีทำ

1. หั่นตะไคร้หอมและผิวมะกรูด
เป็นชิ้นเล็กๆ
2. นำตะไคร้หอม และผิวมะกรูดห่อ
ด้วยผ้าขาวบางแล้วใส่ลงในโหลแก้ว
เติมแอลกอฮอล์ (เอทิลแอลกอฮอล์)
1 ลิตร ลงในโหลแก้ว
3. ใส่การบูร 10 กรัม ลงในโหลแก้ว
ปิดฝาให้แน่น หมักไว้ 7 วัน ระหว่าง
ที่หมักต้องเขย่าโหลแก้วทุกวัน
4. เมื่อครบ 7 วัน นำมาบรรจุขวดสเปรย์
และเขียนฉลากติดข้างขวดไว้ว่าสเปรย์
สมุนไพรไล่ยุง เพื่อความปลอดภัย
ใช้ฉีดไล่ยุงตามมุมอับต่าง ๆ



ข้อมูลจาก : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข



สถานการณ์โรคโควิด 19

(สะสม) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 มิถุนายน 2566

(สัปดาห์ที่ 25)

19 - 25 มิถุนายน 2566)

แผนที่สถานการณ์ใน 7 วัน



จำนวนผู้ป่วยรายใหม่

Jul 25 : 18 Jun-24 Jun 66

1,653 AU

27,645 คน



จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่

36 AU

સુઃસુ 659 AU

ผู้ติดตามรายใหม่ + 564 ราย

อัตราปล่อย 774.4 ต่อคนประชากร

ผู้ติดตามเรื่องละสม 1 ม.ค.66 เป็นต้นมา **3,692** ราย

เสียชีวิต สัปดาห์นี้ + 0 ราย

เสียชีวิตสะสม 1 ม.ค.66 เป็นต้นมา 3 ราย

อยู่ระหว่างรักษา 599 ราย

ជំនួយក្នុង 39 រោង ជំនួយក្នុង 560 រោង


ເປື້ອນ

แหล่ง

LLGV

แนวโน้มนักติดตามเชื้อสะสม จ.น่าน (จำแนกรายสัปดาห์)

ចំណូល (រោម)



อำเภอ
จำนวน(ราย)

 101-200 \$10

51-100 stories

21-50 578

11-20 578

1-10 570

☐ ไม่พบผู้ติดเชื้อ




รายงานการฉีดวัคซีน COVID - 19 จังหวัดน่าน



ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ **1 กรกฎาคม 2566 (16.00 น.)** ทีม Vaccine NAN กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน





ร้อยละผู้ได้รับวัคซีนทุกชนิด



ผลงานการให้บริการ LAAB จังหวัดน่าน

ได้รับจัดสรร **1,019** โดส (ได้รับจัดสรรเพิ่มในสัปดาห์ที่ผ่านมา 150 โดส หมดอายุ 31 ตุลาคม 2566)
ข้อมูลจากการรายงานจากหน่วยบริการวัคซีน

- รวม จ.น่าน : **585 โดส (57%)**
- คงคลัง **434** โดส (**43%**)
(หมดอายุ 31 ตุลาคม 2566 , 30 พ.ย 2566)
- ได้กระจาย LAAB สู่ รพ.ชุมชน เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย



แจ้งขอความร่วมมือเร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิด 19 และ ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB

ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๓๓.๐๐๔/ ๕๖๒๗



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิด 19 และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนโควิด 19 ประจำปี (๒๕๖๖-๒๕๖๗) จำนวน ๓ ฉบับ

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยในช่วงฤดูฝน พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เช่น ในค่ายบำบัดยาเสพติด เรือนจำ โรงงาน/สถานประกอบการ โรงเรียนสถานศึกษา ฯลฯ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาภัยกับระบบสาธารณสุขของประเทศได้ ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีนโยบายและจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ตัดสินใจเข้ารับวัคซีนโควิด 19 เพื่อลดการป่วยที่รุนแรงหรือเสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 ซึ่งจากผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 พบว่า ยังมีกลุ่มเป้าหมายอีกจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้รับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน พิจารณาแล้ว จึงขอให้หน่วยงานของท่าน ได้เร่งรัดดำเนินการดังนี้

๑. ค้นหากลุ่มเป้าหมายประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว ๗ กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ เด็กนักเรียน เด็กเล็ก ผู้ทำงานในสถานประกอบการ โรงงานทั้งชาวไทย ผู้ที่มีเชื้อสายชาติไทย ตลอดจนผู้ที่ไม่ใช่เชื้อชาติที่ไม่เคยได้รับวัคซีน ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น และยังไม่ได้รับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long-Acting Antibody: LAAB) เพื่อตั้งเป็นเป้าหมาย ในการดำเนินการของแต่ละพื้นที่สำหรับการรณรงค์วัคซีนโควิด 19 ประจำปี

๒. ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ขอให้ติดตามและเร่งรัดการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย ข้อ ๑. และประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาด รวมถึงกลุ่มประชากรเสี่ยงอื่นๆ มารับวัคซีน หรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโดยเร็ว

๓. ขอให้พิจารณาจัดจุดบริการวัคซีนและภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปให้สะดวกและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ หรือเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนและภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป

๔. ลงบันทึกผลการฉีดวัคซีนรายบุคคลในระบบและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center ให้เป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๓ ๔๒๖๕ ต่อ ๓๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๗๓ ๔๖๔๒ ต่อ ๒๕๔


ผู้ประสานงาน ๐๘ ๓๙๗๓ ๕๕๔๙



**ผลการดำเนินงานวัคซีนโรค จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
เดือน มิถุนายน 2566**

ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค จ.น่าน ปี 2566 (ผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซ้ำ)

ร้อยละผลงานการค้นหาและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค




ข้อมูล NTIP : ณ 30 มิถุนายน 2566

ผลงานการค้นหาจำแนกรายอำเภอ

อำเภอ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
เมืองน่าน	117	106	90.6
ทุ่งช้าง	27	23	85.2
ภูเพียง	51	31	60.8
สันติสุข	22	12	54.5
เวียงสา	100	52	52.0
น่าน้อย	46	23	50.0
บ้านหลวง	16	8	50.0
ท่าวังผา	72	35	48.6
เชียงกลาง	39	18	46.2
ปัว	92	37	40.2
สองแคว	18	7	38.8
เฉลิมพระเกียรติ	14	4	28.6
บ่อเกลือ	22	6	27.3
แม่จริม	23	6	26.1
นาหมื่น	20	2	10.0
รวม	679	370	55.8

TB Treatment Coverage ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 1 (รายจังหวัด)



PA 66

ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ยื่นทะเบียนรักษา เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2566 (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66)

จังหวัด	จำนวน ที่ใช้ประเมิน	Success		เสียชีวิต		โอนออก	ขาดยา	ล้มเหลว	กำลังรักษา
		ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ				
เชียงใหม่	255	162	63.5	30	11.7	6	9	1	47
เชียงราย	193	107	55.4	21	10.8	9	2	0	54
ลำปาง	165	88	53.3	23	13.9	4	3	0	47
พะเยา	96	60	62.5	11	11.4	6	1	0	18
แพร่	80	41	51.2	13	16.2	2	0	0	24
ลำพูน	62	32	51.6	7	11.2	0	0	0	23
น่าน	74	42	56.7	6	8.1	3	0	0	23
แม่ฮ่องสอน	32	17	53.1	6	18.7	3	0	0	6
รวมเขต	957	549	57.4	117	12.2	33	15	1	242

ครบกำหนดประเมิน 30 กันยายน 2566

โรงพยาบาล	ขึ้นทะเบียนรักษา	รักษาสำเร็จ	เสียชีวิต	ขาดยา	ล้มเหลว	โอนออก	กำลังรักษา
รพ.น่าน	20	10	2				8
รพ.แม่จริม	1		1				
รพ.บ้านหลวง	3	3					
รพ.นาน้อย	5	2	1			1	1
รพ.ปัว	12	5				1	6
รพ.ท่าช้างผา	5	2	1				2
รพ.เวียงสา	10	8	1				1
รพ.เชียงกลาง	4	1					3
รพ.ทุ่งช้าง	7	6					1
รพ.นาหมื่น	0						
รพ.สันติสุข	2	1					1
รพ.บ่อเกลือ	0						0
รพ.สองแคว	2	2					
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	0						
รพ.ภูเพียง	3	2				1	
รวม	74	42(56.7%)	6(8.1%)			3(4.1%)	23(31.1%)