




สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567



10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 5 มี.ค. 67



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

เดือน กุมภาพันธ์ 2567



โรค	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	Median	ปี 2567
Hand foot and mouth disease	27	60	105	7	32	32	80
Pneumonia	341	374	127	141	257	257	276
Food Poisoning	88	101	100	57	165	100	112
Scrub Typhus	35	21	1	4	5	5	17
Leptospirosis	4	1	0	1	3	1	10

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 5 มี.ค. 67




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 1 Hand Foot and Mouth Disease เดือน กุมภาพันธ์ 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Hand foot and mouth disease
จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Hand foot and mouth disease
จำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567



กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 232.22 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : เน้นเฝ้าระวังในสถานรับเลี้ยงเด็ก/ศพด./ร.ร.อนุบาล ตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้า ทำความสะอาดของเล่น ของใช้เป็นประจำหากพบเด็กป่วยให้แยกและแจ้งผู้ปกครองมารับ เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น และที่สำคัญผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลาน

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2567




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 2 Pneumonia เดือน กุมภาพันธ์ 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia จำแนกตามพื้นที่
ระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia จำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567



กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 273.69 ต่อประชากรแสนคน
ข้อเสนอแนะ : เน้นย้ำการดูแลสุขภาพอนามัย และควรเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปในที่ชุมชนและสถานที่แออัดเป็นเวลานานๆ

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2567




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 3 Food poisoning เดือน กุมภาพันธ์ 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567



ที่มา : รายงานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2567
กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป คิดเป็นอัตราป่วย 42.43 ต่อประชากรแสนคน
ข้อเสนอแนะ : ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" ได้แก่ สุก : รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ, ร้อน : อาหารค้ำม้อ ควรอุ่นให้ร้อนก่อนนำมารับประทาน, สะอาด : เลือกซื้ออาหารมีคุณภาพ และล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้ง

สถานการณ์

โรคไข้เลือดออก





สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2567 (ภาพรวมประเทศ)

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2567



1 มกราคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2567

ป่วย	16,512	ราย
อัตราป่วย	24.97	/100,000 ปชก.
ตาย	17	ราย
อัตราป่วยตาย	0.10	ร้อยละ

รายงานเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย	+1,672	ราย
ตาย	+3	ราย




เพศหญิง : เพศชาย
1 : 1

SEX	จำนวน (ราย) *	ร้อยละ
ชาย	8,297	50.2%
หญิง	8,215	49.8%

อาชีพ	จำนวน (ราย) *	ร้อยละ
กบิล	4,155	0.0%
นักเรียน/นักศึกษา...	2,205	17.8%
นักเรียน	1,564	12.7%
คนงานรับจ้างที่...	1,481	12.0%
ในปกครอง	1,477	12.0%

AGE	มากที่สุด (ปี)	มัธยฐาน (ปี)	น้อยสุด (ปี)
	95	20	0

กลุ่มอายุ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	937	32.88	2	0.21
5-14 ปี	4,791	64.27	4	0.08
15-24 ปี	3,832	46.70	3	0.08
25-34 ปี	2,934	31.25	1	0.03
35-44 ปี	1,762	18.03	2	0.11
45-54 ปี	1,032	10.11	2	0.19
55-64 ปี	677	7.79	1	0.15
65 ปีขึ้นไป	547	6.56	2	0.37



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค				
ภาค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย *	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย สะสม (ร้อยละ)
ภาคใต้	5308	55.91	1	0.02
ภาคกลาง (ไม่รวมกทม.)	7197	31.96	10	0.14
ภาคเหนือ	1766	14.34	1	0.06
กรุงเทพฯ	652	11.83	0	0.00



ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต



ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

จัดทำโดย กลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารความเสี่ยง กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151, 3133 Email: dvbresponse@ddc.mail.go.th



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค. – 29 ก.พ. 2567



รายงาน



ผู้ป่วย

สะสม 70 ราย

(อัตราป่วย 14.72 ต่อประชากรแสนคน)

เดือน ม.ค. 32 ราย

เดือน ก.พ. 38 ราย



ไม่มีผู้เสียชีวิต



37 ราย




33 ราย

หญิง : ชาย

1.12 : 1

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567



พื้นที่ระบาด

1. อ.น่าน้อย (บ้านเขตะวัน ต.สันทะ)
2. อ.ปัว (บ้านป่าตอง อ.ศิลาเพชร)
3. อ.เวียงสา (บ้านป่าแพะ ต.แม่ชะนิง)
4. อ.สองแคว (บ้านห้วยมอย ต.ชนแดน)




รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค. – 29 ก.พ. 2567




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ

อัตราป่วย/แสน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567




จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน

จำนวนผู้ป่วย(ราย) เปรียบเทียบข้อมูลปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน กุมภาพันธ์ 2567 มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้ว 1.5 เท่า และสูงกว่ามัธยฐาน 12.7 เท่า

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2567



3 ภัยสุขภาพ

โรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากอากาศร้อนโดยตรง

การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน

กลุ่มเสี่ยง ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน เช่น เล่นกีฬา และฝึกทหาร

การป้องกัน งด แสงออกกำลังกาย ทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรดื่มน้ำให้ได้ 1 ลิตร/ชั่วโมง หรืออย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว ฝ้าระวังเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ



โรคและภัยสุขภาพที่เป็นผลจากอากาศร้อนแล้งและแดดจ้า

ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน มีความเสี่ยงเจ็บป่วยจาก **4 กลุ่มโรค**

- โรคทางเดินหายใจ • โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคตาอักเสบ • โรคผิวหนังอักเสบ

การป้องกัน ปิดประตูหน้าต่างบ้านให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาดบ้าน สวมหน้ากากป้องกัน ไม่เผาขยะ ไม่เผาป่า ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว



ภัยสุขภาพในฤดูร้อน

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ

การป้องกัน ในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นตามลำพัง แม้เพียงชั่วขณะ

หลักในการช่วยเหลือคนตกน้ำ คือ **"ตะโกน โยน ยื่น"** และโทร 1669

รายงานการฉีดวัคซีน





รายงานการฉีดวัคซีน COVID - 19 เข็มกระตุ้นจังหวัดน่าน (กุมภาพันธ์ 2567)



ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ **4 มีนาคม 2567 (16.00 น.)**

ทีม Vaccine NAN กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

การให้บริการวัคซีนประจำปี (เริ่ม 1 พ.ค 2566 - สิ้นสุด ถึง 4 มี.ค. 2567) 2,114 เข็ม

• เข็ม Primary (เข็ม 1 และ เข็ม 2) 244 เข็ม เข็มกระตุ้นประจำปี (เข็ม 3 ขึ้นไป) 1,870 เข็ม


กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นประจำปี หลัง พ.ค 2566	จำนวนเป้าหมาย*	ได้รับเข็มกระตุ้น**(ราย)	%
ทุกกลุ่ม	115,680	1,870	1.61
จำแนกตามกลุ่มประชากรมุ่งเน้นในการรณรงค์			
กลุ่ม 607	39,483	499	1.26
อสม.	4,031	57	1.41
หญิงตั้งครรภ์	630	11	1.75
เด็กนักเรียน 12-17 ปี	6,915	113	1.63
เด็ก 5-11 ปี	6,227	20	0.32
เด็กเล็ก 0-4 ปี	119	8	6.72

* ประเมินการจากผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่เข็ม 2 ขึ้นไป เข็มท้ายสุด เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา (ได้รับวัคซีนเข็มท้ายสุด ก่อน ก.พ 2566)

** ได้รับเข็มกระตุ้นประจำปี คือได้รับวัคซีนเข็ม 3 ขึ้นไปหลัง 1 พฤษภาคม 2566

*** เนื่องจาก MOPH IC มีความล่าช้าในการนำเข้าข้อมูลและประมวลผล อยู่ในช่วงปิดปรับปรุงระบบ ข้อมูลอาจมีต่ำกว่าความเป็นจริง

เร่งรัด : ขอให้ทุกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในทุกเข็ม โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น ในกลุ่มเสี่ยงสำคัญ ได้แก่กลุ่ม 607 อย่างน้อย 1 เข็มต่อปี หรือ ทุก 6 เดือน เพื่อลด อาการป่วยหนัก และ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ



สวัสดีค่ะ

