




สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน
ประจำเดือน มีนาคม 2567



10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

ประจำเดือน มีนาคม 2567



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 25 มี.ค. 67



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

เดือน มีนาคม 2567



โรค	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	Median	ปี 2567
Hand,foot and mouth disease	24	26	151	5	17	24	40
Leptospirosis	5	3	0	0	6	3	9
Scrub Typhus	37	9	4	5	7	7	12
Hepatitis	7	4	5	3	12	5	7
D.H.F.	5	8	1	0	58	5	6

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 25 มี.ค. 67




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 1 Hand Foot and Mouth Disease เดือน มีนาคม 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Hand foot and mouth disease
จำแนกตามพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1 - 25 มีนาคม 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Hand foot and mouth disease
จำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างวันที่ 1 - 25 มีนาคม 2567



กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 124.4 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : เน้นเฝ้าระวังในสถานรับเลี้ยงเด็ก/ศพด./ร.ร.อนุบาล ตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้า ทำความสะอาดของเล่น ของใช้เป็นประจำหากพบเด็กป่วยให้แยกและแจ้งผู้ปกครองมารับ เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น และที่สำคัญผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลาน

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 25 มี.ค. 2567




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 2 Leptospirosis เดือน มีนาคม 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Leptospirosis จำแนกตามพื้นที่
ระหว่างวันที่ 1 - 25 มีนาคม 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Leptospirosis
จำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างวันที่ 1 - 25 มีนาคม 2567



กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วย 6.73 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : กำจัดหนูโดยใช้กับดัก และ สวมชุดป้องกันระยะมัตระวังเมื่อต้องอยู่แหล่งเสี่ยงในชุมชน เช่น ยุงฉางข้าว ห้องครัว ห้องเก็บของ เป็นต้น, หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค, ควรทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วหากแช่ หรือ ย่ำลงไปแหล่งน้ำที่สงสัยว่าอาจปนเปื้อนเชื้อ

ที่มา : รายงานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 25 มี.ค. 2567




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 3 Scrub Typhus เดือน มีนาคม 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Scrub Typhus จำแนกตามพื้นที่
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 25 มีนาคม 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Scrub Typhus
จำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างวันที่ 1 - 25 มีนาคม 2567



ที่มา : รายงานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 25 มี.ค. 2567

กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป คิดเป็นอัตราป่วย 12.73 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของไรอ่อน เช่น ป่าละเมาะ พื้นที่เกษตรไถลป่า ทุ่งหญ้า พุ่มไม้ เป็นต้น หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง พยายามหลีกเลี่ยงการนั่งหรือนอนลงบนพื้นดินหรือหญ้า ไม่ให้ถูกไรอ่อนกัด โดยการสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดปกปิดแขนขา และใช้สารไล่แมลงทาหรือฉีดพ่นทั้งบนผิวหนังและเสื้อผ้า

สถานการณ์

โรคไข้เลือดออก





สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2567 (ภาพรวมประเทศ)

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 มีนาคม 2567



1 มกราคม 2567 - 27 มีนาคม 2567

ป่วย	21,456	ราย
อัตราป่วย	32.31	/100,000 ปชก.
ตาย	22	ราย
อัตราป่วยตาย	0.10	ร้อยละ

รายงานเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย **+866** ราย
ตาย **+3** ราย



เพศหญิง : เพศชาย
1 : 1

SEX	จำนวน (ราย) *	ร้อยละ
ชาย	10,816	50.4%
หญิง	10,640	49.6%


อาชีพ	จำนวน (ราย) *	ร้อยละ
ไม่ทราบ	12,578	58.6%
นักเรียน	3,358	15.7%
รับจ้าง	3,017	14.1%
อื่นๆ	611	2.8%
ข้าราชการ	535	2.5%
เกษตรกร	523	2.4%



มากที่สุด (ปี) มีฐาน (ปี) น้อยสุด (ปี)
108 20 0

กลุ่มอายุ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	1,212	42.53	0	0.00
5-14 ปี	6,065	81.36	0	0.00
15-24 ปี	4,695	57.22	0	0.00
25-34 ปี	3,617	38.53	0	0.00
35-44 ปี	2,156	22.06	0	0.00
45-54 ปี	1,284	12.57	0	0.00
55-64 ปี	861	9.91	0	0.00
65 ปีขึ้นไป	700	8.39	0	0.00

สัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอาการ



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค

ภาค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย *	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย สหสม (ร้อยละ)
ภาคใต้	6720	70.78	0	0.00
ภาคกลาง (ไม่รวมกทม.)	8875	39.41	0	0.00
ภาคเหนือ	2504	20.34	0	0.00
กรุงเทพฯ	785	14.24	0	0.00

ผู้ใหญ่
(15 ปีขึ้นไป)



ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต



ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567

จัดทำโดย กลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารความเสี่ยง กองโรคติดต่อภายใน กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151, 3133 Email: dvbresponse@ddc.mail.go.th



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม - 24 มีนาคม 2567



รายงาน



ผู้ป่วย

สะสม 95 ราย

(อัตราป่วย 19.98 ต่อประชากรแสนคน)

เดือน ม.ค. 33 ราย

เดือน ก.พ. 41 ราย

1 - 24 มี.ค. 21 ราย



ไม่มีผู้เสียชีวิต



48 ราย


หญิง : ชาย

1.02 : 1



47 ราย

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2567



พื้นที่ระบาด

1. อ.น่าน้อย (บ้านเขตวัน ต.สันทะ)
2. อ.เวียงสา (บ้านป่าแพะ ต.แม่ชะนิง)
3. อ.สองแคว (บ้านห้วยมอย ต.ชนแดน)




รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


ข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค. – 24 มี.ค. 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 24 มีนาคม 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน มีนาคม 2567 มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้ว 1.4 เท่า และสูงกว่ามัธยฐาน 8.3 เท่า

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 25 มี.ค. 2567

รายงานการฉีดวัคซีน





รายงานการฉีดวัคซีน COVID - 19 เข็มกระตุ้นจังหวัดน่าน (มีนาคม 2567)



ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ **25 มีนาคม 2567 (16.00 น.)**

ทีม Vaccine NAN กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

การให้บริการวัคซีนประจำปี (เริ่ม 1 พ.ค 2566 - สะสม ถึง 25 มี.ค. 2567) 2,114 เข็ม


• เข็ม Primary (เข็ม 1 และ เข็ม 2) 244 เข็ม เข็มกระตุ้นประจำปี (เข็ม 3 ขึ้นไป) 1,870 เข็ม

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นประจำปี หลัง พ.ค 2566	จำนวนเป้าหมาย* ราย	ได้รับเข็มกระตุ้น**(ราย)	%
ทุกกลุ่ม	115,680	1,870	1.61
จำแนกตามกลุ่มประชากรมุ่งเน้นในการรณรงค์			
กลุ่ม 607	39,483	499	1.26
อสม.	4,031	57	1.41
หญิงตั้งครรภ์	630	11	1.75
เด็กนักเรียน 12-17 ปี	6,915	113	1.63
เด็ก 5-11 ปี	6,227	20	0.32
เด็กเล็ก 0-4 ปี	119	8	6.72

• ประมาณการจากผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่เข็ม 2 ขึ้นไป เข็มท้ายสุด เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา (ได้รับวัคซีนเข็มท้ายสุด ก่อน ก.พ 2566)

** ได้รับเข็มกระตุ้นประจำปี คือได้รับวัคซีนเข็ม 3 ขึ้นไปหลัง 1 พฤษภาคม 2566

*** เนื่องจาก MOPH IC มีความล่าช้าในการนำเข้าสู่ข้อมูลและประมวลผล อยู่ในช่วงปิดปรับปรุงระบบ ข้อมูลอาจมีต่ำกว่าความเป็นจริง



สวัสดีค่ะ

