




สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน
ประจำเดือน เมษายน 2567



10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

ประจำเดือน เมษายน 2567



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 1 พ.ค. 67



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

เดือน เมษายน 2567



โรค	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	Median	ปี 2567
Pyrexia	473	215	221	244	426	244	316
Food Poisoning	111	45	55	39	145	55	106
H.conjunctivitis	104	42	28	30	37	37	62
Influenza	140	27	24	6	74	27	44
Chickenpox	88	19	24	3	32	24	28

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 1 พ.ค. 67




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 1 Pyrexia



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วย Pyrexia จำแนกรายพื้นที่
วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Pyrexia จำแนกเดือน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน เมษายน 2567 มีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่แล้ว 0.7 เท่า และมากกว่ามัธยฐาน 1.3 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน





กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี
คิดเป็นอัตราป่วย 286.13 ต่อประชากรแสนคน

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2567



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

อันดับที่ 2 Food Poisoning



เดือน เมษายน 2567 มีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่แล้ว 0.7 เท่า และมากกว่ามัธยฐาน 1.9 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน



กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 58.06 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : เน้นย้ำให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตามวัย / เฝ้าระวังในสถานรับเลี้ยงเด็ก/ศพด. ให้มีการดูแลสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2567




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 3 H.conjunctivitis



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วย H.conjunctivitis จำแนกรายพื้นที่
วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566



จำนวนผู้ป่วยด้วย H.conjunctivitis จำแนกรายเดือน
เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน เมษายน 2567 มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้ว และมากกว่ามัธยฐาน 1.7 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน



กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 33.17 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : เน้นเฝ้าระวังในสถานรับเลี้ยงเด็ก/ศพด./รร.อนุบาล ตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้า ให้นักเรียน หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือให้สะอาด และที่สำคัญแนะนำให้
ผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลาน หากลูกตาแดง จำเป็นต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหาย เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่คนอื่น

สถานการณ์

โรคไข้เลือดออก





สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2567 (ภาพรวมประเทศ)



1 มกราคม 2567 - 1 พฤษภาคม 2567 รายงานเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย	26,511	ราย
อัตราป่วย	40.09	/100,000 ปชก.
ตาย	29	ราย
อัตราป่วยตาย	0.11	ร้อยละ

ป่วย	+1,348	ราย
ตาย	+7	ราย




เพศหญิง : เพศชาย
1 : 1

SEX	จำนวน (ราย)...	ร้อยละ
ชาย	13,379	50.5%
หญิง	13,132	49.5%

อาชีพ	จำนวน (ราย)...	ร้อยละ
ไม่ทราบ	15,441	58.2%
นักเรียน	4,171	15.7%
รับจ้าง	3,761	14.2%
อื่นๆ	762	2.9%
เกษตรกร	731	2.8%
ข้าราชการ	623	2.4%

AGE	มากที่สุด (ปี)	มัธยฐาน (ปี)	น้อยสุด (ปี)
	108	20	0

กลุ่มอายุ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	1,601	56.18	2	0.12
5-14 ปี	7,782	104.40	8	0.10
15-24 ปี	6,046	73.68	4	0.07
25-34 ปี	4,560	48.58	2	0.04
35-44 ปี	2,755	28.19	4	0.15
45-54 ปี	1,655	16.21	2	0.12
55-64 ปี	1,143	13.15	3	0.26
65 ปีขึ้นไป	969	11.61	4	0.41



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค				
ภาค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย *	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย สะสม (ร้อยละ)
ภาคใต้	7834	82.51	5	0.06
ภาคกลาง (ไม่รวมกทม.)	10257	45.55	14	0.14
ภาคเหนือ	3552	28.85	3	0.08
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3957	18.15	7	0.18

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)



ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต





รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2567



รายงาน



ผู้ป่วย

สะสม 135 ราย

(อัตราป่วย 28.39 ต่อประชากรแสนคน)


เดือน ม.ค. 33 ราย

เดือน ก.พ. 41 ราย

เดือน มี.ค. 25 ราย

เดือน เม.ย. 36 ราย

1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00



	เมืองน่าน	แม่จริม	บ้านหลวง	นาน้อย	ปัว	ท่าวังผา	เวียงสา	ทุ่งช้าง	เชียงกลาง	นาหมื่น	สันติสุข	บ่อเกลือ	สองแคว	ภูเพียง	เฉลิมพระเกียรติ
ปี 2566	14.78	0.00	0.00	0.00	4.65	11.84	11.40	203.71	14.36	0.00	0.00	0.00	1570.11	8.40	10.40
ปี 2567	23.41	50.00	0.00	70.33	30.99	29.61	22.81	33.03	0.00	0.00	19.04	0.00	167.99	14.01	0.00

RIP

ไม่มีผู้เสียชีวิต



75 ราย



60 ราย

หญิง : ชาย

1.25 : 1



พื้นที่ Active

1. อ.เวียงสา (บ้านป่าพะ ต.แม่ชะนิง)
2. อ.สองแคว (บ้านน้ำหล/บ้านวังเสา ต.ชนแดน)
3. อ.แม่จริม (บ้านตองเจริญราษฎร์ ต.แม่จริม)
4. อ.เมือง (บ้านผาตูป/บ้านมงคลนิมิต ต.ผาสิงห์, บ้านห้วยปุก ต.สะเนียน)
5. อ.สันติสุข (บ้านกุ่ม่วง ต.ดู่พงษ์)
6. อ.ท่าวังผา (บ้านหนอง ต.ยม)




รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2567 กับ ปี 2566 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน เมษายน 2567 มีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่แล้ว 4.3 เท่า และมากกว่ามัธยฐาน 1.4 เท่า

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2567

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน



มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน/สถานศึกษา



ก่อนเปิดและปิด ภาคเรียน

- ทำความสะอาดโรงเรียน / สถานศึกษา
- สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกสัปดาห์ ทั้งในพื้นที่อาคารเรียน บริเวณโรงเรียนและบ้านพักครู
- หากมียุงจำนวนมากควรฉีดพ่นก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ (ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบ)

**** ก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์****


ระหว่างเปิดเรียน

- ❖ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดเศษภาชนะที่มีน้ำขัง โดยทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์
- ❖ สำรวจภาชนะเก็บกักน้ำใช้ และทำความสะอาด ขัดล้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำ พร้อมทั้งใส่ทรายกำจัดลูกน้ำหรือใส่ปลากินลูกน้ำ
- ❖ สื่อสาร ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและสังเกตอาการสงสัยโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียน/บุคลากร
- ❖ จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
- ❖ ให้มีการเฝ้าระวังและคัดกรองอุณหภูมินักเรียนที่มีอาการสงสัยก่อนเข้าเรียน หากมีอาการสงสัยเข้าได้กับโรคไข้เลือดออกต้องรีบส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที



สถานการณ์


จำนวนผู้ป่วยด้วย Mushroom poisoning จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2567 กับปี 2567 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวน **31** ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิต

ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวน **1** ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิต





สวัสดีค่ะ

