




สถานการณ์ระบาดของวิทยา จังหวัดน่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567





10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

เดือน กรกฎาคม 2567





โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

เดือน กรกฎาคม 2567


โรค	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	Median	ปี 2567
Influenza	112	18	10	16	80	18	130
Chickenpox	26	13	13	25	5	13	84
Hand, foot and mouth disease	215	7	16	92	68	68	116
Scrub Typhus	76	10	8	27	12	12	59
Pneumonia	207	86	36	143	141	141	185
Leptospirosis	0	2	1	23	33	2	30
Food Poisoning	125	103	27	95	95	95	116
Hepatitis	4	12	3	4	2	4	9
Melioidosis	0	2	0	0	3	0	3
Encephalitis	1	0	0	0	1	0	2




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

อันดับที่ 1 Influenza

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วย Influenza จำแนกรายอำเภอ
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
ปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน กรกฎาคม 2567 มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 7.2 เท่า และมากกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 1.4 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน



เดือน ก.ค. 2567 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 130 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 27.18 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 110.88 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : ผู้ปกครองควรให้บุตรหลานได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และควรป้องกันตนเองและบุตรหลาน โดยการดูแลอนามัยส่วนบุคคลเมื่อเจ็บป่วย
สวมใส่เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้ควรเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยรุนแรงในบุตรหลานโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัวและกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อ

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 6 ส.ค. 2567




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

อันดับที่ 2 Chickenpox




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วย Chickenpox จำแนกรายอำเภอ
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Chickenpox จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
ปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน กรกฎาคม 2567 มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 16.6 เท่า และมากกว่ามัธยฐาน 6.4 เท่า
ในช่วงเวลาเดียวกัน



เดือน ก.ค. 67 มีรายงานผู้ป่วย 83 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 17.35 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 108.89 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : เฝ้าระวังในโรงเรียนควรมีการคัดกรองทุกวัน ผู้ป่วยควรหยุดเรียน, ผู้ปกครองควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใส เพื่อป้องกันความรุนแรงจากการติดเชื้อ

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 6 ส.ค. 2567







โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

อันดับที่ 3 Hand,foot and mouth disease

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วย HFMD จำแนกรายอำเภอ
วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2567

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค HFMD จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
ปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน ก.ค. 2567 มีรายงานผู้ป่วยจำนวน 116 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 24.25 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 431.27 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : เน้นเฝ้าระวังใน ศพด. สถานรับเลี้ยงเด็ก ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิด, คัดกรอง แยกเด็กป่วย, ทำความสะอาดห้องเรียน ของใช้ ของเล่นเป็นประจำ

ที่มา :ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 6 ส.ค. 2567



หน้าฝนมาแล้ว

ระวัง!... “โรคไข้เลือดออก”



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน พ.ศ. 2567



สถานการณ์	ระดับประเทศ (1 ม.ค. – 1 ส.ค. 67)	ระดับเขต (1 ม.ค. – 1 ส.ค. 67)	จังหวัดน่าน (1 ม.ค. – 6 ส.ค. 67)
 ป่วย (ราย)	54,945 ราย	10,218 ราย	1,481 ราย (+668 ราย)
อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	82.23 ต่อประชากรแสนคน	174.10 ต่อประชากรแสนคน	309.59 ต่อประชากรแสนคน
 ตาย (ราย)	44 ราย	4 ราย แพร่, เชียงใหม่, น่าน, เชียงราย	1 ราย (ต.อวน อ.ปัว)
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	ร้อยละ 0.08	ร้อยละ 0.05	ร้อยละ 0.07



อัตราป่วย **สะสม** สูงสุด 5 อันดับแรก

- 1 จังหวัดเชียงราย 397.45 ↑
- 2 จังหวัดภูเก็ต 342.78 ↓
- 3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 288.11 ↑
- 4 จังหวัดน่าน 259.68 ↑
- 5 จังหวัดลำพูน 211.82 ↑

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน



อัตราป่วย **4 สัปดาห์ล่าสุด** สูงสุด 5 อันดับแรก

- 1 จังหวัดเชียงราย 190.37
- 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 117.69
- 3 จังหวัดลำพูน 107.91 ↑
- 4 จังหวัดน่าน 103.53 ↓
- 5 จังหวัดบึงกาฬ 61.87

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน




สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน พ.ศ. 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก(รวม) จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน

1 มกราคม – 6 สิงหาคม 2566 เปรียบเทียบกับ 1 มกราคม – 6 สิงหาคม 2567

5000.00
4500.00
4000.00
3500.00
3000.00
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00




	เมืองน่าน	แม่จริม	บ้านหลวง	น่าน้อย	ปัว	ท่าวังผา	เวียงสา	ทุ่งช้าง	เชียงกลาง	นาหมื่น	สันติสุข	บ่อเกลือ	สองแคว	ภูเพียง	เฉลิมพระเกียรติ
ปี 2566	206.95	31.25	59.05	94.80	204.51	213.16	246.59	1387.44	940.32	368.22	120.57	47.33	4811.08	221.31	197.59
ปี 2567	501.27	456.22	75.92	155.96	199.86	128.29	286.50	616.64	233.28	47.73	203.07	54.09	1293.03	414.61	62.40

อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 5 อันดับแรก (หน่วย : ต่อประชากรแสนคน)

	อัตราป่วยสะสม	อัตราป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด
1	อ.สองแคว 1,234.26 (965.58)	อ.ภูเพียง 145.67 (98.05) ↑
2	อ.ทุ่งช้าง 594.62 (479.00)	อ.สองแคว 142.74 (520.57) ↓
3	อ.เมืองน่าน 466.74 (279.63) ↑	อ.เมืองน่าน 128.59 (146.59) ↓
4	อ.แม่จริม 437.47 (281.23) ↓	อ.แม่จริม 112.49 (68.75) ↑
5	อ.ภูเพียง 397.80 (142.87)	อ.เวียงสา 95.50 (75.54) ↓

อายุ (ปี)	อัตราป่วย
0-4 ปี	219.78
5-9 ปี	439.57
10 – 14 ปี	816.68
15 – 24 ปี	390.60
25 – 34 ปี	354.54
35 – 44 ปี	229.47
45 – 54 ปี	156.32
55 – 64 ปี	285.89
65 ปีขึ้นไป	265.22

สัดส่วนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกตามกลุ่มอาการ




ที่มา : รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา(506) สสจ.น่าน ณ วันที่ 7 ส.ค. 2567



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน พ.ศ. 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดน่าน
ปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



จำนวนผู้ป่วยปี 2567 น้อยกว่าปี 2566 1.3 เท่า และ มากกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 6.3 เท่า
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา : รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา(506) สสจ.น่าน ณ วันที่ 7 ส.ค. 2567



พื้นที่ระบาด ณ 6 สิงหาคม 2567



พื้นที่	จำนวน อำเภอ	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	
ระบาด	5	Activate EOC, ดำเนินงานตาม มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด	พบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด มากกว่า ร้อยละ 25 ของจำนวนตำบลทั้งหมด
เสี่ยง	1	ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด, เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย	พบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด มากกว่า ร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 24.99 ของจำนวนตำบลทั้งหมด
ปกติ	8	ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด, เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย	พบผู้ป่วย, มีตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด ไม่เกินร้อยละ 14.99
ไม่มีรายงาน ผู้ป่วย	1	สุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เป็นประจำ	

มาตรการรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน มิถุนายน - กันยายน 2567

1 เฝ้าระวังโรคและยุงพาหะ
 สำรองและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้มี **ค่า HI, CI น้อยกว่าร้อยละ 5**

2 ตอบโต้และควบคุมยุงพาหะ
 อบรม ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน 3-3-1 และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ

3 วินิจฉัยและรักษา
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรวจผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ ไข้เลือดออก ทุกรายด้วย **NS1**

4 เน้น 4 เดือน

4 สื่อสารความเสี่ยง
 • ให้ความรู้และสถานบริการทางทางแพทย์
 งดจ่ายยา NSAIDs
 • พัฒนา อสม/อสต, ให้นักศึกษาในการสื่อสารความเสี่ยง และ สร้างความรู้รับพฤติกรรมแก่ประชาชน



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน พ.ศ. 2567



พื้นที่ <u>ระบาด</u> ที่ Activate EOC	วัน/เดือน/ปี ที่ Activate EOC
อำเภอน่าน	7 พ.ค. 2567
อำเภอแม่จริม	14 พ.ค. 2567
อำเภอทุ่งช้าง	24 พ.ค. 2567
อำเภอสองแคว	5 มิ.ย. 2567
อำเภอปัว	18 มิ.ย. 2567
อำเภอสันติสุข	3 ก.ค. 2567
อำเภอเวียงสา	4 ก.ค. 256
อำเภอภูเพียง	16 ก.ค. 2567
พื้นที่ active ที่ Activate EOC	วัน/เดือน/ปี ที่ Activate EOC
อำเภอเชียงกลาง	17 มิ.ย. 2567
อำเภอนันทพูน	4 เม.ย. 2567

*เกณฑ์การเปิด EOC ในระดับอำเภอ เมื่อพบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาดมากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนตำบลในอำเภอทั้งหมด

**หมายเหตุ : ตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด หมายถึง ตำบลที่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง, ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด มีการระบาดต่อเนื่อง และยังคงควบคุมโรคไม่ได้



สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดน่าน พ.ศ. 2567

สัปดาห์ที่ 31 (29 ก.ค. — 4 ส.ค. 2567)



ข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค. — 4 ส.ค. 2567



ผู้ป่วยรายใหม่ **+46 ราย**

สะสม 2,863 ราย

อัตราป่วย 598.49 ต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิต




รายใหม่(สัปดาห์นี้) **0 ราย**

สะสม 2 ราย


อัตราป่วยตาย 0.07 (ร้อยละ)

จำนวนผู้ป่วยแยกรายอำเภอ

สัปดาห์ที่ 31 (29 ก.ค. — 4 ส.ค. 2567)



จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำแนกรายสัปดาห์



มัตรวมวิธีรับมือ โรคและภัยสุขภาพ หน้าฝน

โควิด 19

- สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ
เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ปิด/ แออัด
- หากมีไข้ ไอ น้ำมูก ให้แยกตัวจาก
ผู้อื่น เครื่องครัวอนามัยส่วนบุคคล
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
- หาก 1-2 วัน อาการไม่ดีขึ้น รีบไปพบแพทย์



ไข้เลือดออก

- ป้องกันยุงกัด โดยสวมเสื้อผ้ามิดชิด สีส่อน
- ทายา/ สเปรย์กันยุง ใช้อุปกรณ์ไล่ยุง
- กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ในบ้านและรอบบ้าน



เห็ดพิษ



- ซื้อเห็ดจากแหล่งที่เชื่อถือได้
- หลีกเลี่ยงกินเห็ดป่า/ เห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ
- ไม่กินเห็ดดิบ หรือกินร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมี



ไข้หวัดใหญ่

- สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง
- ไม่ใช้ของร่วมกัน
- หากป่วย ให้หยุดเรียน หยุดงาน งดกิจกรรมรวมกลุ่ม
- กลุ่มเสี่ยง ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่



ไข้หูดับ



- ไม่กินเนื้อหมู/ เครื่องใน/ เลือดดิบ ๆ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
- ล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสเนื้อหมู
- ไม่ใช่เบียง มีด ตะเกียบ กับเนื้อหมูดิบและสุกร่วมกัน
- ซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่มีมาตรฐาน

พิษสุนัขบ้า

- หลีกเลี่ยงสัมผัสสุนัข แมว และสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติวัคซีน
- หลีกเลี่ยงการฆ่าและ กิน เนื้อสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
- หากถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน เลีย ให้ล้างแผลทันที ด้วยน้ำและสบู่หลาย ๆ ครั้ง เช็ดให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ โพรพิโดนไอโอดีน และรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่องจนครบโดส
- นำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี



Thank you
for your hard work

