


สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน




ประจำเดือน สิงหาคม 2567





10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

เดือน สิงหาคม 2567





โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน เดือน สิงหาคม 2567


โรค	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	Median	ปี 2567
Influenza	98	21	8	56	256	56	501
Pneumonia	217	102	67	220	203	203	302
Chickenpox	29	9	10	42	18	18	99
Scrub Typhus	40	18	13	32	21	21	74
Hand, foot and mouth disease	99	3	6	205	167	99	148
Leptospirosis	6	12	1	22	20	12	47
Food Poisoning	171	108	33	106	116	108	125
H.conjunctivitis	82	85	35	44	49	49	60
Melioidosis	4	2	1	1	4	2	6
Mumps	0	2	1	3	0	1	4
Malaria	0	0	0	0	1	0	2
Encephalitis	1	1	2	2	0	1	2




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

อันดับที่ 1 Influenza

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza จำแนกรายอำเภอ
วันที่ 1 — 31 สิงหาคม 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 — 31 สิงหาคม 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
ปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน สิงหาคม 2567 มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 2 เท่า และมากกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 8.9 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน

เดือนสิงหาคม 2567 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 501 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 104.73 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 487.09 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : ผู้ปกครองควรให้บุตรหลานได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และควรป้องกันตนเองและบุตรหลาน โดยการดูแลอนามัยส่วนบุคคลเมื่อเจ็บป่วย สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้ควรเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยรุนแรงในบุตรหลานโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อ


ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 2 ก.ย. 2567




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

อันดับที่ 2 Pneumonia

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia จำแนกรายอำเภอ
วันที่ 1 — 31 สิงหาคม 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 — 31 สิงหาคม 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
จำนวนผู้ป่วย(ราย) ปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน สิงหาคม 2567 มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปีที่และมากกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 1.5 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน

เดือน สิงหาคม 2567 มีรายงานผู้ป่วย 302 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 63.13 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 252.95 ต่อประชากรแสนคน
ข้อเสนอแนะ : เน้นย้ำการดูแลสุขภาพอนามัย และควรเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปในที่ชุมชนและสถานที่แออัดเป็นเวลานานๆ

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 2 ก.ย. 2567







โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

อันดับที่ 3 Chickenpox

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วย Chickenpox จำแนกรายอำเภอ
วันที่ 1 — 31 สิงหาคม 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 — 31 สิงหาคม 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Chickenpox จำแนกรายเดือน จ.น่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน สิงหาคม 2567 มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปีและมากกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 5.5 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน

เดือน สิงหาคม 2567 มีรายงานผู้ป่วย 99 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 20.70 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 140.99 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : ฝ้าระวังในโรงเรียนควรมีการคัดกรองทุกวัน ผู้ป่วยควรหยุดเรียน, ผู้ปกครองควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใส เพื่อป้องกัน
ความรุนแรงจากการติดเชื้อ

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 2 ก.ย. 2567





หน้าฝนมาแล้ว

ระวัง!... “โรคไข้เลือดออก”



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2567



สถานการณ์	ระดับประเทศ (1 ม.ค. — 28 ส.ค. 67)	ระดับเขต (1 ม.ค. — 28 ส.ค. 67)	จังหวัดน่าน (1 ม.ค. — 2 ก.ย. 67)
 ป่วย (ราย)	68,329 ราย	10,218 ราย	1,814 ราย (+333 ราย)
อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	103.32 ต่อประชากรแสนคน	220.15 ต่อประชากรแสนคน	379.20 ต่อประชากรแสนคน
 ตาย (ราย)	51 ราย	6 ราย แพร่, เชียงใหม่, น่าน, เชียงราย	1 ราย (ต.อวน อ.ปัว)
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	ร้อยละ 0.07	ร้อยละ 0.05	ร้อยละ 0.06



อัตราป่วย **สะสม** สูงสุด 5 อันดับแรก

- 1 จังหวัดเชียงราย 471.66 (397.45)
- 2 จังหวัดภูเก็ต 402.07 (342.78)
- 3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 396.72 (288.11)
- 4 จังหวัดน่าน 325.96 (259.68)
- 5 จังหวัดลำพูน 292.50 (211.82)

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน



อัตราป่วย **4 สัปดาห์ล่าสุด** สูงสุด 5 อันดับแรก

- 1 จังหวัดเชียงราย 114.39 (190.37)
- 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 103.72 (117.69)
- 3 จังหวัดลำพูน 93.42 (107.91)
- 4 จังหวัดน่าน 89.86 (103.53)
- 5 จังหวัดภูเก็ต 69.80 ↑


หน่วย : ต่อประชากรแสนคน



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน ตั้งแต่ 1 ม.ค. — 2 ก.ย. 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก(รวม) จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน
วันที่ 1 มกราคม - 2 กันยายน 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 มกราคม - 2 กันยายน 2567



อัตราป่วยสะสม	อัตราป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด
1 อ.สองแคว 1,410.58 (1,293.03)	อ.ภูเพียง 145.67 (98.05)
2 อ.ทุ่งช้าง 644.17 (616.64)	อ.สองแคว 142.74 (520.57)
3 อ.เมืองน่าน 616.77 (501.27)	อ.เมืองน่าน 128.59 (146.59)
4 อ.ภูเพียง 568.69 (414.61) ↑	อ.สันติสุข 101.54 (69.81) ↑
5 อ.แม่จริม 499.97 (456.22) ↓	อ.เวียงสา 95.50 (75.54)

อายุ (ปี)	อัตราป่วย
0-4 ปี	265.39
5-9 ปี	538.57
10 — 14 ปี	983.9
15 — 24 ปี	484.58
25 — 34 ปี	440.02
35 — 44 ปี	284.32
45 — 54 ปี	191.85
55 — 64 ปี	337.41
65 ปีขึ้นไป	326.75

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 2 ก.ย. 2567



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน ตั้งแต่ 1 ม.ค. — 2 ก.ย. 2567



อำเภอ	จำนวนตำบล	จำนวนตำบลระบาด	ร้อยละการระบาดระดับอำเภอ	หมายเหตุ
ภูเพียง	7	5	71.43	ด.นาบึง, ด.น้ำเกียน, ด.น้ำแก่น, ด.ฝายแก้ว, ด.ม่วงดี
สองแคว	3	2	66.67	ด.ชนแดน, ด.นาไร่หลวง
เมืองน่าน	11	7	63.64	ด.ไชยสถาน, ดู่ใต้, ใบเวียง, ฝาสิงห์, เรือง, สวก, สะเนียน
ทุ่งช้าง	4	2	50.00	ด.งอบ, ด.ทุ่งช้าง, และ
เฉลิมพระเกียรติ	2	1	50.00	ด.ห้วยโก๋น
สันติสุข	3	1	33.33	ด.ดู่พงษ์
เวียงสา	17	5	29.41	ด.กลางเวียง, ด.น้ำบิว, ด.แม่ชะบิง, ด.ส้าน, อ่าวนาโหล
ปัว	12	3	25.00	ด.อวน, ด.สากด, ด.สถาน
แม่จริม	5	1	20.00	ด.น้ำพาง
ท่าวังผา	10	2	20.00	ด.ท่าวังผา, ด.ผากอง
เชียงกลาง	6	1	16.67	ด.เชียงกลาง
นาหมื่น	4	0	0.00	
บ้านหลวง	4	0	0.00	
น่าน้อย	7	0	0.00	
บ่อเกลือ	4	0	0.00	

พื้นที่	จำนวนอำเภอ	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	หมายเหตุ
ระบาด	8	Activate EOC, ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด	พบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด มากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนตำบลทั้งหมด
เสี่ยง	3	ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด, เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย	พบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด มากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 24.99 ของจำนวนตำบลทั้งหมด
เฝ้าระวัง	4	ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย	พบผู้ป่วย, มีตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด ไม่เกินร้อยละ 14.99
ไม่มีรายงานผู้ป่วย	0	สุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำ	

มาตรการรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน มิถุนายน - กันยายน 2567

1 เฝ้าระวังโรคและยุงพาหะ

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้ได้ คำ HI, CI น้อยกว่า ร้อยละ 5

2 ตอบโต้และควบคุมยุงพาหะ

อปท. ควบคุมโรคได้ตามมาตรการ 3-3-1 และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ

4 เน้น 4 เดือน

3 5ปัจจัยและรักษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรวจผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ ไข้เลือดออก ทุกรายด้วย NS1

4 สื่อสารความเสี่ยง

- ให้รับยาขายและสถานบริการทางการแพทย์ จ่ายยา NSAIDs
- พัฒนา อสม/อศต. ให้มีศักยภาพในการสื่อสารความเสี่ยง และ สร้างความรู้ปรับพฤติกรรมแก่ประชาชน

มาตรการเสริมการใช้สารกักกันยุง

ผู้ป่วย

กลุ่มเด็ก


กลุ่มผู้สูงอายุ

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สสจ.น่าน ณ วันที่ 2 ก.ย. 2567

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน ตั้งแต่ 1 ม.ค. — 2 ก.ย. 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก(รวม) จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดน่าน
ปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง





จำนวนผู้ป่วยปี 2567 น้อยกว่าปี 2566 1.4 เท่า และ มากกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 6.4 เท่า
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 2 ก.ย. 2567



ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2567





**Thank you
for your hard work**

