



Covid 19 Vaccine

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

28 ก.พ. 2565





ฉีดสะสม 769,473 โดส				แยกจำนวนที่ได้รับการฉีดวัคซีน-โดส							คงคลัง
ปชก. เป้าหมายในการฉีดวัคซีน – MOPH IC 429,265				ชนิดวัคซีน	รวม	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มที่ 3	เข็มที่ 4	รวม 19,229 โดส	
รวมทุกกลุ่ม		โดส	ร้อยละ	AstraZeneca	293,903	72,675	187,985	32,916	326	3,990	
	เข็ม 1	323,784	75.43	Pfizer	245,047	54,815	90,525	99,374	4,329	13,914	
	เข็ม 2	307,007	71.52	Pfizer 5-11ปี		4,326	25	1		1,090	
	เข็ม 3 จากปชก.คงเหลือที่ต้องฉีดเข็ม3	133,819	59.81	Sinovac	183,449	175,160	8,284	5		47	
	เข็ม 4	4,854		Sinopharm	36,178	18,241	17,932	5		188	
				Moderna	5,849	2,424	2,233	993	199	(ณ 27ก.พ.65)	
กลุ่มเป้าหมายหลัก		ปชก.	เข็ม 1	%	เข็ม 2	%จากปชก.	เข็ม 3	% เข็ม3จากค้างฉีดเข็ม2	ค้างฉีดเข็ม3		
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป	608	130,298 ราย	111,058	85.23	107,053	82.16	ตั้งเป้ามี.ค. > 50%		51,739		
กลุ่มโรคหญิงตั้งครรภ์							55,046	42.06			
เด็ก 5-11 ปี	ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี	18,829 ราย	5,281	28.05	31	0.16					



วัคซีนคงคลังรายอำเภอ

Pfizer	27 กพ 65										
รพ.	EXP 3/3/65		EXP 10/3/65		EXP 17/3/65		EXP 18/3/65		รวม จ่าย	รวม คงเหลือ	
	จ่าย (ขวด)	เหลือ (ขวด)	จ่าย (ขวด)	เหลือ (ขวด)	จ่าย (ขวด)	เหลือ (ขวด)	จ่าย (ขวด)	เหลือ (ขวด)	(ขวด)	(ขวด)	(โดส)
1. น่าน			0	93	0	91	0	190	0	374	2,244
2. แม่จรม					15	189			15	189	1,134
3. บ้านหลวง	0	39	0	48	0	30	0	30	0	147	882
4. นาน้อย					0	96	0	164	0	260	1,560
5. ปัว			0	117	0	128	0	140	0	385	2,310
6. ท่าวังผา					0	30	0	5	0	35	210
7. เวียงสา	0	96	0	118	0	110			0	324	1,944
8. ห่งช้าง			0	26			0	5	0	31	186
9. เชียงกลาง			0	13					0	13	78
10. นาหมื่น					0	114	0	101	0	215	1,290
11. สันติสุข					0	26	0	15	0	41	246
12. บ่อเกลือ			0	39	0	7			0	46	276
13. สองแคว			0	22					0	22	132
14. ภูเพียง					0	20	0	200	0	220	1,320
15. เฉลิมพระเกียรติ			0	17					0	17	102
รวม	0	135	0	493	15	841	0	850	15	2,319	13,914

AstraZeneca	27 กพ 65		
รพ.	Exp 31/3/65		
	จ่าย (ขวด)	เหลือ (ขวด)	เหลือ (โดส)
1. น่าน	0	73	730
2. แม่จรม	1	11	110
3. บ้านหลวง	0	12	120
4. นาน้อย	0	0	0
5. ปัว	0	74	740
6. ท่าวังผา			
7. เวียงสา	0	29	290
8. ห่งช้าง	0	19	190
9. เชียงกลาง	0	43	430
10. นาหมื่น	0	35	350
11. สันติสุข	0	25	250
12. บ่อเกลือ	0	14	140
13. สองแคว	0	23	230
14. ภูเพียง	0	11	110
15. เฉลิมพระเกียรติ	0	30	300
รวม	1	399	3,990



ความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในรพ.สต.

รพ.สต.ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ จังหวัดน่าน

เดือนกุมภาพันธ์

จำนวนรพ.สต. ลง
บันทึกฉีดวัคซีนผ่าน
ระบบMOPH IC

ฉีดสะสมเข็ม 1 (ราย) จำนวนเพิ่มขึ้น
% สัดส่วน
เพิ่ม

ฉีดสะสมเข็ม 2 (ราย) จำนวนเพิ่มขึ้น
% สัดส่วน
เพิ่ม

ฉีดสะสมเข็ม 3 (ราย) จำนวนเพิ่มขึ้น
% สัดส่วนเพิ่ม
ฉีดสะสมเข็ม 3 ในรอบ 4 wks

1-ก.พ.-65	20	775			1,245			2,118			2,118
8-ก.พ.-65	43	866	91	10.51	1,291	46	3.56	3,301	1,183	35.84	3,301
15-ก.พ.-65	77	1,814	948	52.26	2,172	881	40.56	19,175	15,874	82.78	19,175
18-ก.พ.-65	102	2,147	333	15.51	2,426	254	10.47	23,317	4,142	17.76	23,317
27-ก.พ.-65	107	3,142	995	31.67	3,457	1,031	29.82	33,197	9,880	29.76	33,197



ฉีดวัคซีน COVID-19รายอำเภอ

ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ; Operation Vaccine Nan สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เข็ม 3

ampurname	เข็ม 3	บุคลากร ทาง การแพทย์	อสม	ผู้สูงอายุ	กลุ่มโรค	ด้านหน้า	ประชาชนทั่วไป	mom	student	student 5_11
เมืองน่าน	42,789	1,912	1,446	10,700	4,200	1,088	23,187	81	46	
แม่จริม	3,946	116	46	1,147	431	30	2,127	8	35	
บ้านหลวง	3,077	105	188	782	468	90	1,436	5	2	
น่าน้อย	6,803	163	374	2,429	1,068	80	2,626	11	14	
ปัว	14,591	488	700	4,396	1,693	219	6,875	46	9	
ท่าวังผา	13,768	238	352	4,961	2,142	53	5,920	18	32	1
เวียงสา	11,366	340	718	4,320	1,287	87	4,572	12	9	
ทุ่งช้าง	4,169	148	332	1,248	364	155	1,906	7	4	1
เขียงกลาง	8,078	171	624	3,024	776	91	3,362	11	4	
นาหมื่น	4,543	102	246	1,699	479	213	1,798	2	1	
สันติสุข	3,148	121	234	758	310	35	1,671	4	5	
บ่อเกลือ	3,584	97	187	501	225	66	2,472	21	8	
สองแคว	2,684	102	151	719	249	53	1,390	5	10	
ภูเพียง	7,630	180	507	2,519	1,015	32	3,349	10	10	
เฉลิมพระเกียรติ	3,117	76	28	397	248	68	2,288	9	2	
เข็ม 3	133,819	4,359	6,133	39,600	14,955	2,360	64,979	250	191	2

ปชก.MOPH IC 429,265 31.17

จากปชก.คงเหลือที่ต้องฉีดเข็ม3 223,738 59.81

รวมแผน wk 1 มีนาคม 2565 สรุปส่งกรมคร. ณ 25 กพ 65 16.30 น.										
ลำดับ	อำเภอ/ คปสอ.	จำนวน เปิดหน่วย ฉีดวัคซีน โควิด 19	กพ 28	เดือนมีนาคม 2565						
				1	2	3	4	5	6	SUM
1	เมืองน่าน	8	500	200	200	200	200	-	-	1,300
2	ภูเพียง	11	150	50	200	150	100	-	-	650
3	ท่าวังผา	17	-	180	180	540	390	-	-	1,290
4	แม่จริม	9	-	130	230	70	90	-	150	670
5	บ้านหลวง	5	200	-	200	200	200	-	-	800
6	สันติสุข	5	-	106	86	356	-	-	-	548
7	น่าน้อย	10	200	200	300	500	300	-	-	1,500
8	เวียงสา	32	-	400	200	700	1,430	-	-	2,730
9	นาหมื่น	6	150	120	150	150	200	-	-	770
10	ปัว	15	-	-	-	-	-	-	-	-
11	บ่อเกลือ	5	200	100	150	100	150	-	-	700
12	สองแคว	4	-	160	50	100	-	-	-	310
13	เฉลิม	6	161	443	267	41	-	-	-	912
14	เขียงกลาง	10	670	-	-	300	100	-	-	1,070
15	ทุ่งช้าง	8	-	80	240	60	120	-	-	500
SUM	หน่วยฉีด	151	2,231	2,319	2,453	3,467	3,380	-	150	14,000

อำเภอ	SV 1 ยังไม่ได้ รับเข็ม 2	อำเภอ	ข้อมูลผู้ยังไม่ได้รับ vaccine เข็มที่ 1 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565				
			มีโรคประจำตัว	อสม	ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	หญิงตั้งครรภ์	รวม
เฉลิมพระเกียรติ	29	เฉลิมพระเกียรติ	28		217	8	253
เขียงกลาง	40	เขียงกลาง	64	4	441	2	511
ท่าวังผา	104	ท่าวังผา	156	5	980	31	1172
ทุ่งช้าง	30	ทุ่งช้าง	33		266	21	320
น่าน้อย	78	น่าน้อย	100	5	763	23	891
นาหมื่น	4	นาหมื่น	21		252		273
บ่อเกลือ	39	บ่อเกลือ	50	4	392	7	453
บ้านหลวง	12	บ้านหลวง	28	1	140	4	173
ปัว	124	ปัว	185	9	1452	23	1669
ภูเพียง	80	ภูเพียง	92	3	576	3	674
เมืองน่าน	142	เมืองน่าน	174	16	1704	22	1916
แม่จริม	26	แม่จริม	37		219	12	268
เวียงสา	192	เวียงสา	338	17	1729	29	2113
สองแคว	19	สองแคว	38	1	160	11	210
สันติสุข	24	สันติสุข	38	5	375	5	423
รวม	943	รวม	1382	70	9666	201	11319

ข้อมูล รับเข็ม 2 แล้วครบกำหนดรับเข็ม 3 :รับเข็ม 2 ช่วง กค -ธค64 แยกรายอำเภอตามที่อยู่จริง type 1+3 (ข้อมูล ณ 26 กพ.65)															รวม ยังไม่ได้เข็ม 3 ณ 19กพ	ลดลง จาก วันที่ 19กพ
อำเภอ	S1+A2กค	S1+A2สค	A1+A2สค	S1+A2กย	A1+A2กย	S1+A2ตค	A1+A2ตค	S1+S2	S1+A2 พย	A1+A2พย	S1+A2 ธค	A1+A2ธค	SP1+SP2	รวม ยังไม่ได้เข็ม 3 ณ 26กพ	รวม ยังไม่ได้เข็ม 3 ณ 19กพ	ลดลง จาก วันที่ 19กพ
เมืองน่าน	70	498	82	1835	337	3095	389	104	1860	53	191	3	1445	9,962		
ภูเพียง	25	188	41	1073	74	1584	288	30	1648	204	152	1	521	5,829	6822	993
ท่าช้างผา	7	227	38	1205	102	1445	140	8	2365	25	226	2	469	6,259	7485	1,226
แม่จริม	4	125	2	230	33	474	58	1	521	4	137	1	135	1,725	1961	236
บ้านหลวง		33	9	111	4	179	20	2	499	1	284		23	1,165	1421	256
สันติสุข		41	1	329	32	435	16	3	777	3	106	2	43	1,788	2,048	260
นาน้อย	9	189	43	624	55	1100	8	4	2789		493	18	63	5,395	6003	608
เวียงสา	38	326	10	1590	123	3451	282	30	3912	369	812	13	654	11,610	13106	1,496
นาหมื่น	2	45		106	15	370	11	3	771	6	32		75	1,436	1670	234
ปัว	19	171	139	2144	102	2510	238	22	2962	87	619	17	1150	10,180	11906	1,726
บ่อเกลือ	3	27	25	390	5	845	6	5	1038	2	216		66	2,628	3,012	384
สองแคว	1	3	1	38	3	114	5	1	254	8	450	2	7	887	998	111
เฉลิมพระเกียรติ	2	17		37	6	67	4	1	211	1	598	1	13	958	1,191	233
เชียงกลาง	1	74	23	139	19	333	18	4	1092	20	124		85	1,932	2370	438
ทุ่งช้าง	4	17	12	158	15	431	13	3	1116	12	327		39	2,147	2547	400
ไม่มีที่อยู่ตามtype 1+	114	557	94	1987	274	4520	362		5099	105	768	16	1029	14,925	16210	1,285
รวม	299	2538	520	11996	1199	20953	1858	221	26914	900	5535	76	5817	78,826	90,322	11,496

ประเด็นมุ่งเน้น

- เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 โดยเน้นให้ประชาชนได้รับวัคซีนเข็ม 3 (กระตุ้น)
- โดยเฉพาะกลุ่ม 608 (อายุ 60ปีขึ้นไป, โรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค, หญิงตั้งครรภ์)
- กลุ่มประชาชนพื้นที่ห่างไกล, กลุ่มประชาชนในพื้นที่ชายแดน,
- กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง
- กลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุ 5-11 ปี(เข็มแรก) / อายุ 12-17 ปี(เข็ม 2)
- บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน “ค้นหา-ช่วยเหลือ” กลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงบริการฉีดวัคซีน





ศูนย์สื่อสาร
โควิด 19 น่าน

4 ข้อปฏิบัติห่างไกล โควิด 19

- 1 Vaccine** ฉีดวัคซีน เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต
- 2 Universal Prevention** ป้องกันตนเอง กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
- 3 COVID Free Setting** สถานที่ปลอดภัย ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ
ตรวจ ATK เป็นประจำ
- 4 ATK** ตรวจ ATK รู้ก่อนมีผลเสีย ป้องกันการแพร่ระบาด

THANK YOU

โรงพยาบาลน่าน
เปิดบริการ

เชิงรุก

ให้บริการ

ฉีดวัคซีนโควิด-19

ถึงที่บ้าน

และ ที่ชุมชน
(ฉีดวัคซีนได้ทุกเข็ม)



สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ, ผู้ที่เดินทางไม่สะดวก

ท่านสามารถติดต่อ
แจ้งรับการฉีดวัคซีน ได้ที่...

โทร. **097-0248232**

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บุคคลทั่วไป

ขอเชิญรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ได้ที่

ห้องรพ. ชั้น 5

อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

(หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)



กระทรวงสาธารณสุข

จากการประชุมผ่านระบบ **VDO Conference**

วันที่ **24** กุมภาพันธ์ **2565**

ข้อสั่งการ (24 กุมภาพันธ์ 2565)

ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบริหารจัดการและฉีดวัคซีนตามนโยบายดังต่อไปนี้

1. เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ตามสูตรการฉีดวัคซีนภายใต้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
2. เร่งรัดการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ภายในเดือนมีนาคม 2565
3. เร่งรัดการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี
 - 3.1 สูตร Pfizer-Pfizer ผ่านระบบสถานศึกษา
 - 3.2 สูตร Sinovac-Pfizer หรือ Sinovac-Sinovac (แนะนำฉีดกระตุ้นด้วย Pfizer) ให้จัดช่องทางการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน (อายุ 6 ปีขึ้นไป)
4. ส่งเสริมการบริการฉีดวัคซีนใน รพ.สต. หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เห็นสมควร โดยจัดให้มีคลังและให้เปิดฉีดวัคซีนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ขอรับวัคซีนครบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการฉีดเป็นเข็มที่ 1 และ 2

2

- พิจารณาภายใต้
1. คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้วัคซีนตามที่ให้บริการจริงในประเทศ (Real-world vaccine effectiveness) ร่วมกับ
 3. เงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
 4. ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

		ระยะห่างระหว่างเข็ม	
		เข็มที่ 1	เข็มที่ 2
สูตรแนะนำ สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป		AstraZeneca	AstraZeneca
		AstraZeneca	Pfizer
		Pfizer	AstraZeneca
		Moderna	Moderna
สูตรแนะนำ สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 - 17 ปี	ผู้ที่มีอายุ 5 - 6 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	Pfizer ฝาสีส้ม
	ผู้ที่มีอายุ 6 - 11 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	Pfizer ฝาสีส้ม
		Sinovac	Pfizer ฝาสีส้ม
	ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี	Pfizer ฝาสีม่วง	Pfizer ฝาสีม่วง
		Sinovac	Pfizer ฝาสีม่วง
	ผู้ที่มีอายุ 6 - 17 ปี	Sinovac**	Sinovac**
ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนได้ตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน			

หมายเหตุ *ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำระยะห่าง 8 สัปดาห์

**ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม (หรือวัคซีนทางเลือก Sinopharm) ควรเข้ารับการกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer 1 เข็ม (ขนาดตามช่วงอายุของผู้รับวัคซีน) โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการฉีดเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster dose)

3

	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 3	หมายเหตุ
วัคซีน กระตุ้น เข็มที่ 3	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	AstraZeneca	
	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	3 เดือน	AstraZeneca	
	Sinovac/Sinopharm	Pfizer	3 เดือน	Pfizer	
	AstraZeneca	AstraZeneca	3 เดือน	Pfizer	
	Pfizer	Pfizer	6 เดือน	Pfizer	เริ่มดำเนินการ เม.ย. 65
	AstraZeneca	Pfizer	6 เดือน	Pfizer	เริ่มดำเนินการ พ.ค. 65
	AstraZeneca	AstraZeneca	3 - 6 เดือน	AstraZeneca	

	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มที่ 3	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 4	หมายเหตุ
วัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 4	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	3 เดือน	AstraZeneca	ฉีดในบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่ม 608 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ทั่วประเทศ และ ประชาชนใน 10 จังหวัดนำร่อง ท่องเที่ยว
	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	Pfizer	3 เดือน	Pfizer	

- หมายเหตุ
- เพิ่มทางเลือกให้ผู้รับวัคซีนสามารถรับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นได้ ในผู้ที่รับการฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็ม โดยหากเว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนสูตร AZ-AZ-AZ ภูมิอาจไม่สูงเท่าการฉีดวัคซีน AZ-AZ-PF ให้พิจารณาฉีดผู้ที่ไม่ต้องการฉีด mRNA
 - วัคซีน Moderna สามารถเป็นเข็มกระตุ้นได้ในทุกสูตรวัคซีนข้างต้น

แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ของประเทศไทย เดือนมีนาคม 2565

- แต่ละจังหวัดจะได้รับการจัดสรรวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) เป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1 ของจำนวนวัคซีนที่กรมควบคุมโรคได้รับมอบจากบริษัทผู้ผลิตในแต่ละสัปดาห์ (กรมการแพทย์ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนคงที่ 30,000 โดส/สัปดาห์)
- ขอให้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) ดังนี้
 - วัคซีนสูตร Pfizer-Pfizer สำหรับฉีดเด็กสุขภาพปกติ ให้บริการผ่านระบบสถานศึกษาเท่านั้น โดยเริ่มที่นักเรียนชั้น ป.6 และถดถอยไปตามลำดับ
 - วัคซีนสูตร Sinovac-Pfizer ให้จัดช่องทางการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน
 - ให้บริหารจัดการวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้จำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและวัคซีนที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยจัดลำดับความสำคัญให้กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 - 1) เข็มที่ 1 และ 2 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีที่มี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
 - 2) ผู้ที่มีนัดเข็มที่ 2 ของทุกสูตร
 - 3) เข็มที่ 1 ของสูตร Pfizer-Pfizer เริ่มที่นักเรียนชั้น ป.6 จนครบแล้ว จึงฉีดในชั้นปีถดถอยไปตามลำดับ
 - 4) เข็มกระตุ้นในเด็กที่มีประวัติการฉีดวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

สูตรที่	ชนิดวัคซีน	ระยะห่างระหว่างเข็ม	ให้บริการฉีดผ่าน	
			ระบบสถานศึกษา	ระบบสถานพยาบาล
1	Pfizer-Pfizer (ฝาสีส้ม)	8 สัปดาห์	✓	เฉพาะเด็กป่วย 7 กลุ่มโรค และเด็กตกค้าง
2	Sinovac-Pfizer (ฝาสีส้ม)	4 สัปดาห์	✓	สามารถลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนล่วงหน้า
3	Sinovac-Sinovac*	4 สัปดาห์	✓	กับสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. กำหนดไว้ โดยสามารถเลือกสูตรได้ตามความสมัครใจ

* ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม (หรือวัคซีน Sinopharm) แนะนำให้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer 1 เข็ม (ขนาดตามช่วงอายุของผู้รับวัคซีน) โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

แผนการบริหารจัดการวัคซีนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน และการเร่งรัดการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ

รูปแบบการดำเนินงาน

- ร่วมมือกับ**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**ในการดำเนินการค้นหาและเร่งรัดให้ประชาชน/ผู้สูงอายุเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
- ให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแบบ walk-in ได้ตามสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร กำหนดไว้
- ส่งเสริมให้ **รพ.สต. หรือสถานพยาบาลอื่นๆ** ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครเห็นสมควร ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้
- ให้ทุก รพ.สต. มีวัคซีน**คงคลัง**เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และสามารถเปิดฉีดวัคซีนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีผู้รับวัคซีนครบจำนวนตามโดสสูงสุดที่สามารถฉีดได้ในแต่ละขวดวัคซีน

รูปแบบในการให้บริการของ รพ.สต. เพื่อบริการประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

- การให้บริการเชิงรุก
- การให้บริการในสถานที่ที่ใกล้ที่พักอาศัย
- การให้บริการในสถานที่ประกอบการ
- การให้บริการในแหล่งชุมชน

ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19

ผลการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

- จำนวนผู้ถึงกำหนดรับวัคซีนเข็มกระตุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 32.9 ล้านคน
- จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว (ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565) 18.1 ล้านคน (ร้อยละ 55.0)
- คาดประมาณจำนวนผู้ถึงกำหนดรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเดือนมีนาคม 2565 38.0 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 5.1 ล้านคน)

จังหวัดที่มีสัดส่วนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สูงสุด 10 จังหวัด (ไม่รวม กทม.)

เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวนผู้ถึงกำหนดรับเข็มกระตุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (คน)	จำนวนผู้ได้รับเข็มกระตุ้น ณ 23 ก.พ. 65 (คน)	ร้อยละการฉีดเข็มกระตุ้นในผู้ที่ถึงกำหนดนัดเดือนกุมภาพันธ์ 2565
11	ภูเก็ต	414,343	317,972	77
4	นนทบุรี	930,927	687,610	74
1	ลำพูน	219,315	155,558	71
1	น่าน	177,455	124,568	70
6	สมุทรปราการ	1,315,711	894,592	68
1	ลำปาง	269,999	178,048	66
4	พระนครศรีอยุธยา	522,877	337,304	65
7	มหาสารคาม	287,291	183,435	64
1	เชียงใหม่	821,520	503,005	61
6	ระยอง	550,741	336,386	61

แนวทางการให้บริการ วัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565)



แผนฉีด Pfizer (ฟาซิสม) สำหรับเด็ก

ฉีดแรก

- อายุ 5-11 ปี เป็นโรคเรื้อรัง
7 กลุ่มโรค กุมารแพทย์พิจารณา

ฉีดถัดไป

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทุกจังหวัด

- ตามสัดส่วนนักเรียน
- สำรวจกรณีระบาดในพื้นที่
- ฉีดในสถานพยาบาล
หรือเด็ก Homeschool

แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

2

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายอายุต่ำกว่า 18 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่เด็ก และเหมาะสมกับจำนวนวัคซีนในพื้นที่ โดยพิจารณาจาก 1) คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2) คำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 3) คำแนะนำภายใต้การขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกอบกับบริบทการให้บริการวัคซีนในประเทศไทยมีความหลากหลายแตกต่างกันทั้งในเขตเมือง ชนบท รวมถึงพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ซึ่งอาจมีทรัพยากร ระบบการขนส่งและจัดเก็บวัคซีน หรือระบบให้บริการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละช่วงเวลา คำแนะนำการฉีดวัคซีน จึงคำนึงถึงปัจจัยเชิงนโยบายการจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมประชากรในประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย	ชนิดวัคซีน*	ขนาดวัคซีน	ระยะห่างระหว่างเข็ม
อายุ 5-6 ปี	Pfizer 2 เข็ม	ฟาซิสม (10 ไมโครกรัม/0.2 ml)	8 สัปดาห์ (ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2)
อายุ 6-11 ปี	Pfizer 2 เข็ม	ฟาซิสม (10 ไมโครกรัม/0.2 ml)	8 สัปดาห์ (ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2)
	สูตรไขว้ Sinovac-Pfizer	เข็มที่ 1 Sinovac 0.5 ml/โดส เข็มที่ 2 Pfizer ฟาซิสม (10 ไมโครกรัม/0.2 ml)	4 สัปดาห์ (ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2)
อายุ 12-17 ปี	Pfizer 2 เข็ม	ฟาซิสม (30 ไมโครกรัม/0.3 ml)	3-4 สัปดาห์ (ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2)
	สูตรไขว้ Sinovac-Pfizer	เข็มที่ 1 Sinovac 0.5 ml/โดส เข็มที่ 2 Pfizer ฟาซิสม (30 ไมโครกรัม/0.3 ml)	4 สัปดาห์ (ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2)
อายุ 6-17 ปี	Sinovac 2 เข็ม**	0.5 ml/โดส	4 สัปดาห์ (ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2)

* สูตรการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็ก ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครอง ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำจากกุมารแพทย์

** ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม (หรือวัคซีนทางเลือก Sinopharm) ทั้งนี้ แนะนำควรเข้ารับการกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer 1 เข็ม (ขนาดตามช่วงอายุของผู้รับวัคซีน) โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

THANK YOU