

การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา


เดือน เมษายน 2565

จังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบบทางวิทยา


จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2565



ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ

จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2565

ร้อยละ



ควบคุม-กำกับ-ติดตาม : การเฝ้าระวัง สอบสวนและรายงานโรคต่อทางระบาดวิทยา (ระบบรายงาน 506)

ฝนตก น้ำขัง โดนมยุงลายกัด เสี่ยงป่วยโรคไข้เลือดออก

9:45 Sun 24 Apr

80%

พยากรณ์โรค

และภัยสุขภาพ รายสัปดาห์

ฉบับที่ 16/2565 วันที่ 24 - 30 เม.ย. 65

สถานการณ์



ผู้ป่วย 1,098 ราย



เสียชีวิต 2 ราย

ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 5-14 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ กทม.
(ข้อมูล 1 ม.ค. - 20 เม.ย. 65)

อาการ

อ่อนเพลีย



ไข้สูงเฉียบพลัน



เบื่ออาหาร



หน้าแดง



ปวดท้อง



คลื่นไส้อาเจียน



ผื่นขึ้นที่ผิวหนัง



การป้องกัน

เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่ง ไม่มีบริเวณอับทึบที่
ยุงลายเกาะพัก



เก็บขยะ เศษภาชนะที่ไม่ต้องการใส่ในถุง มัดปิดปาก
และทิ้งลงถังขยะ



เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำ ล้างคว่ำภาชนะ
เปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์
ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำหรือปล่อยปลากินลูกน้ำ



ไม่ให้ยุงกัด ทายากันยุง และนอนในมุ้ง

หากมีไข้สูง ให้กินยาพาราเซตามอล ห้ามกินยาลดไข้ประเภท NSAIDs ได้แก่
แอสไพริน ไอบรูโพรเฟน ไดโคลฟีแนก เพราะจะทำให้เลือดออกรุนแรงและเสี่ยงเสียชีวิตได้

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


มกราคม - เมษายน 2565

นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน ได้รับรายงาน

- ผู้ป่วย **โรคไข้เลือดออก** จำนวน 4 ราย (**อัตราป่วย 0.84**)
- ในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 3 ราย (**อัตราป่วย 31.2**)
- ในพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง 1 ราย (**อัตราป่วย 5.5**)

ประเด็นมุ่งเน้น

- : การเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะในกลุ่ม **“ใช้ไม่ทราบสาเหตุ”**
- : การป้องกันการเกิดโรค สื่อสาร key message **“3 เก็บ 3 โรค”**
- : การควบคุมโรค มาตรการ **“3-3-1”**



อัตราป่วย 2565

“3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”



เก็บบ้าน

ให้สะอาดปลอดโปร่ง
ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง



เก็บขยะ

กำจัดเศษภาชนะต่าง ๆ
ไม่ให้成为แหล่งเพาะพันธุ์ยุง



เก็บน้ำ

ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด
ป้องกันยุงลายวางไข่



ป้องกัน



โรคไข้เลือดออก



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา



โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ที่มาข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การสอบสวนควบคุมโรค ใช้มาตรการ 3-3-1

3

โรงพยาบาลรายงานผู้ป่วย
ให้ ทีมสอบสวนโรค/รพ.สต.ทราบ ภายใน 3 ชั่วโมง

3

ทีมสอบสวนโรค/จนท.รพ.สต.
ลงสอบสวนโรคเบื้องต้น ภายใน 3 ชั่วโมง
(จัดสเปรย์บ้านผู้ป่วย)

1

ผู้นำชุมชน/จนท./อปท.
พ่นเคมีควบคุมโรคและกำจัดลูกน้ำ ภายใน 1 วัน