


การเฝ้าระวังการระบาดของวิทยา จังหวัดน่าน

เดือน กรกฎาคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน เดือน 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2565

Disease อัตราป่วยต่อแสนประชากร



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี


จังหวัดน่าน เดือน กรกฎาคม 2565

โรค	60	61	62	63	64	Median	65
(1) Mushroom Poisoning	7	0	0	0	1	0	3
(2) Leptospirosis	4	11	0	2	1	2	16
(3) Mumps	3	0	1	0	0	0	1
(4) Hand foot and mouth disease	20	120	215	7	16	20	61
(5) Chikungunya fever	0	0	1	28	0	0	1
(6) Meningococcal Meningitis	0	0	0	0	0	0	1
(7) Chickenpox	48	21	26	13	13	21	24
(8) Dengue Total (26,27,66)	70	115	69	71	5	70	79

ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ

จังหวัดน่าน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2565

ร้อยละ



ควบคุม-กำกับ-ติดตาม : การเฝ้าระวัง สอบสวนและรายงานโรคต่อทางระบาดวิทยา (ระบบรายงาน 506)



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565


ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 29

1 มกราคม - 27 กรกฎาคม 2565

ป่วย 13,238 ราย
อัตราป่วย 19.94 /100,000 ปชก.
ตาย 8 ราย
อัตราป่วยตาย 0.06 ร้อยละ

เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย +2,211 ราย
ตาย +1 ราย



เพศหญิง : เพศชาย

1 : 1

เพศ	จำนวน (ร...	ร้อยละ
หญิง	6,629	50.1%
ชาย	6,609	49.9%

อาชีพ	จำนวน (ร...	ร้อยละ
นักเรียน	5,997	45.3%
รับจ้าง	2,265	17.1%
ไม่ทราบ	1,938	14.6%
เกษตรกรรม	1,429	10.8%
อื่นๆ	502	3.8%

1 - 5 / 14



มากที่สุด (ปี) มัธยฐาน (ปี) น้อยสุด (ปี)


94

18

0

กลุ่มอายุ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	788	25.19	0	0.00
5-14 ปี	4,217	54.72	1	0.02
15-24 ปี	3,093	36.07	3	0.10
25-34 ปี	2,039	21.96	0	0.00
35-44 ปี	1,285	12.75	3	0.23
45-54 ปี	841	8.21	0	0.00
55-64 ปี	559	6.81	0	0.00
65 ปีขึ้นไป	416	5.37	1	0.24

สัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จำแนกตามกลุ่มอาการ



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค

ภาค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
ภาคเหนือ	6,806	54.90	4	0.06
กรุงเทพฯ	1,072	19.05	0	0.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,649	12.08	1	0.04
ภาคกลาง	1,854	10.95	2	0.11
ภาคใต้	857	9.04	1	0.12


ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

จัดทำโดย กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กองโรคติดต่อภายใน กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151 Email: dvbdresponse@ddc.mail.go.th



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565

ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 29



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค เขต และจังหวัด

ภาค ▼ เขต ▼ จังหวัด ▼

ภาค	เขต ▲	จังหวัด	ป่วยสะสม (ราย)	อัตราป่วย สะสม (ต่อประชากร แสนคน)	ตายสะสม (ราย)	อัตราป่วย ตาย สะสม (ร้อยละ)	ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)	ตาย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)
เหนือ	1	ลำปาง	154	20.99	0	0.00	90	0
เหนือ	1	น่าน	222	46.49	0	0.00	72	0
เหนือ	1	แม่ฮ่องสอน	3,777	1,328.33	1	0.00	1,808	1
เหนือ	1	เชียงใหม่	656	36.82	0	0.00	357	0
เหนือ	1	ลำพูน	15	3.72	0	0.00	8	0
เหนือ	1	เชียงราย	132	10.18	0	0.00	56	0
เหนือ	1	พะเยา	51	10.85	0	0.00	25	0
เหนือ	1	แพร่	40	9.10	0	0.00	22	0
เหนือ	2	พิษณุโลก	250	29.16	1	0.00	118	0
เหนือ	2	อุตรดิตถ์	94	20.85	0	0.00	55	0
เหนือ	2	สุโขทัย	99	16.74	0	0.00	55	0
เหนือ	2	เพชรบูรณ์	138	13.98	0	0.00	71	0
เหนือ	2	ตาก	734	109.89	0	0.00	335	0
เหนือ	3	กำแพงเพชร	58	8.06	0	0.00	19	0
เหนือ	3	นครสวรรค์	208	19.81	0	0.00	102	0

หมายเหตุ 4 สัปดาห์ล่าสุด หมายถึง สัปดาห์ที่ 25 - 28 (วันที่ 19 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2565)

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

จัดทำโดย กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151 Email: dvbdresponse@ddc.mail.go.th

สถานการณ์โรคติดต่อฯ โดยยุ่งลาย เขตสุขภาพที่ 1



ประจำสัปดาห์ที่
29
17-23 กรกฎาคม
2565

สถานการณ์โรคติดต่อฯ โดยยุ่งลาย ประเทศไทย

ลำดับ	จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด					
	ไข้เลือดออก		ชิคุนกุนยา		ไวรัสซิกา	
	จังหวัด	อัตราป่วย	จังหวัด	อัตราป่วย	จังหวัด	อัตราป่วย
1	แม่ฮ่องสอน	1321.02	กาฬสินธุ์	4.61	น่าน	7.98
2	ตาก	108.49	มุกดาหาร	3.13	อุดรดิตถ์	6.03
3	น่าน	46.65	จันทบุรี	2.42	เชียงราย	0.54
4	เชียงใหม่	36.66	สุโขทัย	2.21	นนทบุรี	0.23
5	ศรีสะเกษ	33.69	กทม.	1.87	กทม.	0.22
รวม	ประเทศ	20.01	ประเทศ	0.42	ประเทศ	0.14

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อไวรัสซิกา เขต 1

จังหวัด	ไข้เลือดออก		ไวรัสซิกา	
	อัตราป่วย	อัตราป่วยตาย	อัตราป่วย	อัตราป่วยตาย
เชียงใหม่	36.65	0	0.00	0
ลำพูน	3.74	0	0.00	0
ลำปาง	21.25	0	0.41	0
แม่ฮ่องสอน	1321.02	0	0.00	0
เชียงราย	10.17	0	0.54	0
พะเยา	10.98	0	0.00	0
แพร่	9.20	0	0.00	0
น่าน	46.65	0	7.98	0
เขต 1	85.91	0	0.82	0



ค่าดัชนีลูกน้ำ (HI, CI) เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	HI	CI
เชียงใหม่	16.88	2.06
ลำพูน	19.29	3.11
ลำปาง	10.26	7.08
แม่ฮ่องสอน	16.72	3.66
เชียงราย	44.83	9.83
พะเยา	N/A	N/A
แพร่	7.14	3.70
น่าน	6.45	1.51
เขตสุขภาพที่ 1	18.27	3.74

หมายเหตุ: ค่า HI, CI สัปดาห์ที่ 29 (17-23 กรกฎาคม 2565)
ที่มา: โปรแกรมเฝ้าระวังโรค 29 กรกฎาคม 2565

ที่มา: รายงาน 506 จากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ 29 กรกฎาคม 2565

แผนที่แสดงการเกิดโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อไวรัสซิกา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2565



หมายเหตุ: จังหวัดเชียงใหม่ป่วย 4 สัปดาห์ จำนวน 269 ราย (ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา) แต่ไม่สามารถระบุราย
อำเภอได้ เนื่องจากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคสคร.1 ไม่ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล: รายงาน 506 จากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ 29 กรกฎาคม 2565

ที่มา: Event based surveillance สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2565

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


1 มกราคม - 2 สิงหาคม 2565

ศูนย์ระบาดวิทยา สสจ.น่าน ได้รับรายงาน
ผู้ป่วย **โรคไข้เลือดออก** จำนวน **238** ราย
(อัตราป่วย **50.38**)

- อ.น่าน 80 ราย (อัตราป่วย **238.6**)
- อ.ปัว 98 ราย (อัตราป่วย **158.2**)
- อ.เฉลิมพระเกียรติ 16 ราย (อัตราป่วย **134.2**)
- อ.นาหมื่น 11 ราย (อัตราป่วย **75.01**)
- อ.แม่จริม 7 ราย (อัตราป่วย **43.75**)
- อ.ทุ่งช้าง 7 ราย (อัตราป่วย **34.0**)
- อ.เชียงกลาง 4 ราย (อัตราป่วย **14.4**)
- อ.ท่าวังผา 6 ราย (อัตราป่วย **10.2**)
- อ.เมืองน่าน 7 ราย (อัตราป่วย **9.1**)
- อ.ภูเพียง 2 ราย (อัตราป่วย **5.6**)




ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อัตราป่วยไข้เลือดออก ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2565



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

1 มกราคม - 2 สิงหาคม 2565



จำนวนผู้ป่วยใช้เลือดออกรายสัปดาห์ จำแนกรายอำเภอ

อำเภอ	สัปดาห์ที่เริ่มป่วย																															ผลรวม ทั้งหมด
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
อ.ปัว																		2	1	7	13	13	18	10	8	3	8	2	5	8		98
อ.นาหมื่น																			7	4	6	9	12	2	10	11	2	9	1	7		80
อ.เฉลิมพระเกียรติ		2		1														1		1			1	1	2	3	1	1	2			16
อ.นาหมื่น																										1	2	4	2	2		11
อ.แม่จริม																					1					5					1	7
อ.ทุ่งช้าง							1															1		1	2					1	1	7
อ.เมืองน่าน																					3					1		1	1	1		7
อ.ท่าวังผา																	1			1			2						2			6
อ.เขียงกลาง																													4			4
อ.ภูเพียง																												2				2
ผลรวมทั้งหมด	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	13	23	24	33	14	22	24	13	19	17	19	2	238

สรุปผลสำรวจลูกน้ำยุงลาย สัปดาห์ที่ 30 จังหวัดน่าน

(ระหว่างวันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2565)

ชื่ออำเภอ	จน.ครัวเรือน	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	HI* บ้าน	รวมจำนวน ภาชนะที่ สำรวจ	รวมจำนวน ภาชนะที่ พบลูกน้ำ	CI* ภาพรวม
เมืองน่าน	29,696	18,431	62.1	804	4.36	58,466	1,305	2.23
ปัว	18,029	15,049	83.5	285	1.89	31,668	403	1.27
ท่าวังผา	14,973	20,117	134.4	549	2.73	47,075	897	1.91
ภูเพียง	10,210	7,701	75.4	192	2.49	25,873	249	0.96
เวียงสา	22,532	15,588	69.2	457	2.93	50,478	608	1.20
นาน้อย	10,233	6,613	64.6	261	3.95	37,980	278	0.73
เฉลิมพระเกียรติ	2,858	634	22.2	10	1.58	17,824	442	2.48
เขียงกลาง	8,645	8,260	95.5	138	1.67	2,101	14	0.67
สองแคว	3,178	3,039	95.6	105	3.46	9,490	68	0.72
แม่จริม	4,414	2,914	66.0	211	7.24	29,201	236	0.81
ทุ่งช้าง	6,709	1,808	26.9	83	4.59	5,956	129	2.17
บ้านหลวง	3,673	3,438	93.6	46	1.34	2,641	134	5.07
สันติสุข	4,420	4,105	92.9	15	0.37	8,311	306	3.68
บ่อเกลือ	4,205	3,370	80.1	90	2.67	6,174	143	2.32
นาหมื่น	4,468	3,440	77.0	168	4.88	12,013	194	1.61
รวม จ.น่าน	148,507	114,507	77.1	3,414	2.98	345,251	5,406	1.57

มาตรการควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชน : มาตรการ 3-3-1-7-14-21-28

กรณีพบผู้ป่วยรายแรกๆ ของหมู่บ้าน ให้ควบคุมโรค โดยมีเป้าหมาย

- Day 7: ดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI และ CI ในรัศมี 100 เมตรจากบ้านผู้ป่วยเป็นศูนย์
- Day 14: HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 5
- Day 21 : HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 5 CI ของรพ./โรงเรียน/วัด/โรงแรม/โรงงาน ในตำบล=0

- รายงานผู้ป่วย 3 ชม.แรก

- กำจัดลูกน้ำ+ฉีดสเปรย์กระพือ

ในบ้านผู้ป่วย 3 ชม.ต่อมา

ดำเนินการซ้ำใน

รัศมี 100 เมตร

ดำเนินการใน

หมู่บ้านที่พบผู้ป่วย

Day

(นับจากวันที่พบผู้ป่วย)

0

1

3

7

14

21

28

กำจัดลูกน้ำ พ่นสารเคมี
รัศมี 100 เมตร โดย อปท.

- ดำเนินการในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย
- หากเกิดโรคหลายหมู่บ้านให้ดำเนินการ
ทั้งตำบล

- กำจัดลูกน้ำทุก 7 วัน
- สสจ. ประเมิน HI CI ในตำบล
ที่ระบาดต่อเนื่อง

หมายเหตุ

- คงมาตรการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนทุก 7 วัน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
- คงมาตรการพ่นสารเคมีเสริมทุก 7 วันหากยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง
- ถ้าพบผู้ป่วยตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปใน 28 วันในกลุ่มบ้าน / หมู่บ้านเดียวกัน ให้พ่นสารเคมีทั้งกลุ่มบ้าน/หมู่บ้านนั้นๆ เพิ่มเติมจากรัศมี 100 เมตร

“3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”



เก็บบ้าน

ให้สะอาดปลอดโปร่ง
ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง



เก็บขยะ

กำจัดเศษภาชนะต่าง ๆ
ไม่ให้เปื้อนแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



เก็บน้ำ

ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด
ป้องกันยุงลายวางไข่



ป้องกัน

- ✓ โรคไข้เลือดออก
- ✓ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ✓ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ที่มาข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การสอบสวนควบคุมโรค ใช้มาตรการ 3-3-1

ประเด็นมุ่งเน้น

- : การเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะในกลุ่ม “ใช้ไม่ทราบสาเหตุ”
- : การป้องกันการเกิดโรค สื่อสาร key message “3 เก็บ 3 โรค”
- : การควบคุมโรค มาตรการ “3-3-1”

3

โรงพยาบาลรายงานผู้ป่วย
ให้ ทีมสอบสวนโรค/รพ.สต.ทราบ ภายใน 3 ชั่วโมง

3

ทีมสอบสวนโรค/จนท.รพ.สต.
ลงสอบสวนโรคเบื้องต้น ภายใน 3 ชั่วโมง
(วัดสเปรย์บ้านผู้ป่วย)

1

ผู้นำชุมชน/จนท./อปท.
พ่นเคมีควบคุมโรคและกำจัดลูกน้ำ ภายใน 1 วัน

สรุป ข้อเสนอแนะ และมาตรการ

(สรุป)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ พบว่า
ผู้ป่วยใช้เลือดออก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กวัยเรียน

(ข้อเสนอแนะ/มาตรการ)

พื้นที่เกิดโรค/ระบาด

เคร่งครัดมาตรการควบคุมโรค

3-3-1-7-14-21-28

เตรียมความพร้อมระบบการดูแล-รักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤต และระบบการส่งต่อ

พื้นที่สีเขียว

เคร่งครัดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค

ดำเนินการเฝ้าระวัง-ควบคุมโรค อย่างต่อเนื่อง

คัดกรองและเฝ้าระวังในกลุ่มโรคใช้ไม่ทราบสาเหตุ

ซักซ้อม/เตรียมพร้อมรับมือการเกิดโรคและการระบาดของโรคในพื้นที่ ตามมาตรการควบคุมโรค