

การเฝ้าระวังการระบาดของวิทยา จังหวัดน่าน


เดือน สิงหาคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบาดวิทยา

จังหวัดน่าน เดือน สิงหาคม 2565

Disease อัตราป่วยต่อแสนประชากร



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน สิงหาคม 2565

โรค	2560	2561	2562	2563	2564	Median	2565
Diarrhoea	444	341	522	312	148	341	374
Hand,foot and mouth disease	30	102	99	3	6	30	175
Chickenpox	30	28	29	9	10	28	37
Leptospirosis	6	4	6	12	1	6	18
Mushroom poisoning	1	0	9	7	2	2	6
Mumps	2	1	0	2	1	1	3
Encephalitis	0	0	1	1	2	1	2
Meningitis,uns.	4	0	0	0	3	0	2
Rubella	0	0	0	1	0	0	1
Measles	0	1	1	0	0	0	1



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565

ประจำสัปดาห์ระบาดที่ 33

1 มกราคม - 24 สิงหาคม 2565

ป่วย 19,380 ราย
อัตราป่วย 29.28 /100,000 ปชก.
ตาย 14 ราย
อัตราป่วยตาย 0.07 ร้อยละ

เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย +1,968 ราย
ตาย +0 ราย

เพศหญิง : เพศชาย
1 : 1

เพศ	จำนวน (ร...	ร้อยละ
ชาย	9,699	50.0%
หญิง	9,681	50.0%

อาชีพ	จำนวน (ร...	ร้อยละ
นักเรียน	8,781	45.3%
รับจ้าง	3,457	17.8%
ไม่ทราบ	2,892	14.9%
เกษตรกรรม	1,898	9.8%
อื่นๆ	707	3.6%


1 - 5 / 15 < >



มากที่สุด (ปี) 94
มัธยฐาน (ปี) 18
น้อยสุด (ปี) 0

กลุ่มอายุ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	1,129	37.61	0	0.00
5-14 ปี	6,282	82.80	3	0.05
15-24 ปี	4,509	53.76	4	0.09
25-34 ปี	2,961	31.76	0	0.00
35-44 ปี	1,863	18.73	3	0.16
45-54 ปี	1,213	11.87	1	0.08
55-64 ปี	803	9.48	1	0.12
65 ปีขึ้นไป	620	7.71	2	0.32

สัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จำแนกตามกลุ่มอาการ



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค

ภาค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
ภาคเหนือ	9,447	76.56	5	0.05
กรุงเทพฯ	1,647	29.63	0	0.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4,112	18.83	2	0.05
ภาคกลาง	2,942	17.34	6	0.20
ภาคใต้	1,232	13.00	1	0.08


ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

จัดทำโดย กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151 Email: dvbdresponse@ddc.mail.go.th



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565

ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 33



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค เขต และจังหวัด

ภาค ▼ เขต ▼ จังหวัด ▼

ภาค	เขต ▲	จังหวัด	ป่วยสะสม (ราย)	อัตราป่วย สะสม (ต่อประชากรแสนคน)	ตายสะสม (ราย)	อัตราป่วย ตาย สะสม (ร้อยละ)	ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)	ตาย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)
เหนือ	1	ลำปาง	258	35.50	0	0.00	132	0
เหนือ	1	น่าน	317	66.55	0	0.00	76	0
เหนือ	1	แม่ฮ่องสอน	4,885	1,712.64	2	0.00	1,450	1
เหนือ	1	เชียงใหม่	1,180	66.04	0	0.00	378	0
เหนือ	1	ลำพูน	21	5.23	0	0.00	4	0
เหนือ	1	เชียงราย	210	16.19	0	0.00	77	0
เหนือ	1	พะเยา	63	13.52	0	0.00	13	0
เหนือ	1	แพร่	69	15.83	0	0.00	29	0
เหนือ	2	พิษณุโลก	338	39.84	1	0.00	101	0
เหนือ	2	อุตรดิตถ์	147	32.85	0	0.00	54	0
เหนือ	2	สุโขทัย	151	25.74	0	0.00	67	0
เหนือ	2	เพชรบูรณ์	174	17.75	0	0.00	45	0
เหนือ	2	ตาก	951	141.22	0	0.00	254	0
เหนือ	3	กำแพงเพชร	124	17.39	0	0.00	49	0
เหนือ	3	นครสวรรค์	332	31.99	0	0.00	116	0

หมายเหตุ 4 สัปดาห์ล่าสุด หมายถึง สัปดาห์ที่ 29 - 32 (วันที่ 17 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2565)

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

จัดทำโดย กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151 Email: dvbdresponse@ddc.mail.go.th



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่

สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย เขตสุขภาพที่ 1

ประจำสัปดาห์ที่
32

7 - 13 สิงหาคม 2565



สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ประเทศไทย

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด						
ลำดับ	ไข้เลือดออก		ไข้ปวดข้อยุงลาย		ไวรัสชิกา	
	จังหวัด	อัตราป่วย	จังหวัด	อัตราป่วย	จังหวัด	อัตราป่วย
1	แม่ฮ่องสอน	1556.75	กาฬสินธุ์	10.35	น่าน	8.82
2	ตาก	135.95	มุกดาหาร	5.11	อุดรดิตถ์	6.37
3	เชียงใหม่	56.78	จันทบุรี	3.17	นครราชสีมา	0.62
4	น่าน	52.32	กทม.	2.80	เชียงราย	0.62
5	ศรีสะเกษ	43.18	สุโขทัย	1.88	ลำปาง	0.40
รวม	ประเทศ	26.31	ประเทศ	0.64	ประเทศ	0.19

สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย เขต 1


จังหวัด	ไข้เลือดออก		ปวดข้อยุงลาย		ไวรัสชิกา	
	อัตราป่วย	อัตราป่วยตาย	อัตราป่วย	อัตราป่วยตาย	อัตราป่วย	อัตราป่วยตาย
เชียงใหม่	56.78	0	0.28	0	0.00	0
ลำพูน	4.24	0	0.00	0	0.00	0
ลำปาง	35.60	0	0.14	0	0.41	0
แม่ฮ่องสอน	1556.75	0.04	0.00	0	0.00	0
เชียงราย	16.02	0	0.00	0	0.62	0
พะเยา	12.49	0	0.00	0	0.00	0
แพร่	14.96	0	0.23	0	0.00	0
น่าน	52.32	0	1.47	0	8.82	0
เขต 1	107.62	0	0.24	0	0.90	0



ค่าดัชนีลูกน้ำ (HI, CI) เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	HI	CI
เชียงใหม่	66.67	5.15
ลำพูน	N/A	N/A
ลำปาง	24.61	10.74
แม่ฮ่องสอน	3.77	0.89
เชียงราย	N/A	N/A
พะเยา	N/A	N/A
แพร่	N/A	N/A
น่าน	N/A	N/A
เขตสุขภาพที่ 1	21.90	7.03

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2565 , ปี 2564 และค่ามัธยฐาน 5 ปี (2560-2564)



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


1 มกราคม - 1 สิงหาคม 2565

ศูนย์ระบาดวิทยา สสจ.น่าน ได้รับรายงาน
ผู้ป่วย **โรคไข้เลือดออก** จำนวน **317** ราย
(อัตราป่วย 66.65)

- อ.น่าน้อย **115** ราย (อัตราป่วย 315.67)
- อ.เฉลิมพระเกียรติ **18** ราย (อัตราป่วย 187.18)
- อ.ปัว **119** ราย (อัตราป่วย 184.37)
- อ.นาหมื่น **14** ราย (อัตราป่วย 95.38)
- อ.แม่จริม **10** ราย (อัตราป่วย 62.49)
- อ.ทุ่งช้าง **8** ราย (อัตราป่วย 43.08)
- อ.เมืองน่าน **16** ราย (อัตราป่วย 19.71)
- อ.ภูเพียง **5** ราย (อัตราป่วย 14)
- อ.เชียงกลาง **4** ราย (อัตราป่วย 14.4)
- อ.ท่าวังผา **7** ราย (อัตราป่วย 13.81)
- อ.บ่อเกลือ **1** ราย (อัตราป่วย 6.76)




ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อัตราป่วยไข้เลือดออก ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2565



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

1 มกราคม - 31 กันยายน 2565



จำนวนผู้ป่วยใช้เลือดออกจังหวัดน่านรายสัปดาห์จำแนกตามหมู่บ้าน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2565

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	สัปดาห์ที่เริ่มป่วย									ผลรวมทั้งหมด
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
อ.น่าน้อย										115
ด.เชียงทอง										4
แด									1	1
ป่าสัก					1		1			2
ด.น้ำตก										59
บ้านเปา			5		4	3	4	1		17
ด.บัวใหญ่										2
หนองห้า							1			1
ด.ศรีสะเกษ										6
กิตตินันท์									1	1
ด.สถาน										25
นาดอย	6		2		1	1			1	11
อ.บัว										115
ด.บัว										8
ป่าลาน								1		1
ด.ป่ากลาง										44
ค้างส่อ		3	2	1	1			1		8
ป่ากลาง		1					2			3
สวนทราย	1								1	2
ห้วยสะนาว				2	1			3		6
ด.ภูคา										3
दैยห้วยงอน								1		1
ด.ศิลาเพชร										4
ดอนทรายทอง								1		1
สกาต									1	1
ภูออก									1	1
ด.สถาน										35
บ้าน					1			1		2
सान 1		2						1		3

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	สัปดาห์ที่เริ่มป่วย									ผลรวมทั้งหมด
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
อ.ท่าวังผา										7
ด.ป่าคา										2
สบขุน				1					1	2
อ.ภูเพียง										5
ด.ฝายแก้ว										4
ฝายแก้ว								1	1	2
อ.เมืองน่าน										15
ด.ไชยสถาน										2
คำใหม่ไชยเจริญ								1		1
นาท่อ							1			1
ด.ในเวียง										2
หัวเวียงใต้								1		1
ด.เรือง										2
ตาแวน							1			1
ด.สวก										1
สวกพัฒนา							1			1
ด.สะเนียน										4
สองแคว								2	1	3
ใหม่เจริญสุข									1	1
อ.แม่จริม										10
ด.น้ำพาง										8
น้ำตาง									1	1
ร่มเกล้า						1		1		2
ด.หนองแดง										2
สว่าง								1		1
ผลรวมทั้งหมด	7	6	9	4	9	5	11	17	11	79

สรุปผลสำรวจลูกน้ำยุงลายสัปดาห์ที่ ประจำสัปดาห์ที่ 34 (22 ก.ค-28 สค.65) จ.น่าน รายอำเภอพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกสีแดง สีเหลือง เฉพาะจุด บ้าน วัด โรงเรียน															
ชื่ออำเภอ	จน.ครัวเรือน				ค่า HI บ้าน					% การ พบลูกน้ำ วัด					% การพบ ลูกน้ำ โรงเรียน
		จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ		จน.วัด	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ		จน.โรงเรียน	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	
เมืองน่าน	29696	19100	64.32	864	4.52	79	79	100.00	9.00	11.39	54	40	74.07	10	25.00
ปัว	18029	8200	45.48	217	2.65	60	60	100.00	1.00	1.67	44	16	36.36	2	12.50
ท่าวังผา	14973	11808	78.86	206	1.74	57	57	100.00	3.00	5.26	42	29	69.05	0	0.00
ภูเพียง	10210	7950	77.86	275	3.46	35	35	100.00	0.00	0.00	13	13	100.00	0	0.00
เวียงสา	22532	15666	69.53	389	2.48	78	78	100.00	7.00	8.97	66	44	66.67	4	9.09
นาน้อย	10233	7460	72.90	325	4.36	34	34	100.00	6.00	17.65	14	14	100.00	0	0.00
เฉลิมพระเกียรติ	2858	612	21.41	0	0.00	1	1	100.00	0.00	0.00	13	1	7.69	0	0.00
เขียงกลาง	8645	8202	94.88	108	1.32	37	37	100.00	0.00	0.00	26	26	100.00	0	0.00
สองแคว	3178	2329	73.29	58	2.49	9	9	100.00	2.00	22.22	12	8	66.67	0	0.00
แม่จริม	4414	2505	56.75	147	5.87	16	16	100.00	1.00	6.25	16	16	100.00	7	43.75
ทุ่งช้าง	6709	944	14.07	47	4.98	21	14	66.67	2.00	14.29	15	15	100.00	1	6.67
บ้านหลวง	3673	3456	94.09	50	1.45	12	10	83.33	2.00	20.00	7	7	100.00	0	0.00
สันติสุข	4420	3435	77.71	15	0.44	16	16	100.00	0.00	0.00	15	15	100.00	0	0.00
บ่อเกลือ	4205	3533	84.02	117	3.31	8	8	100.00	0.00	0.00	15	14	93.33	0	0.00
นาหมื่น	4468	3061	68.51	102	3.33	15	15	100.00	0.00	0.00	17	17	100.00	0	0.00
รวม จ.น่าน	148507	98261	66.17	2920	2.97	474	469	98.95	33.00	7.04	388	275	70.88	24	8.73

“3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”



เก็บบ้าน

ให้สะอาดปลอดโปร่ง
ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง



เก็บขยะ

กำจัดเศษภาชนะต่าง ๆ
ไม่ให้เปื้อนแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



เก็บน้ำ

ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด
ป้องกันยุงลายวางไข่



ป้องกัน

- ✓ โรคไข้เลือดออก
- ✓ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ✓ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ที่มาข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การสอบสวนควบคุมโรค ใช้มาตรการ 3-3-1

ประเด็นมุ่งเน้น

- : การเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะในกลุ่ม “ใช้ไม่ทราบสาเหตุ”
- : การป้องกันการเกิดโรค สื่อสาร key message “3 เก็บ 3 โรค”
- : การควบคุมโรค มาตรการ “3-3-1”

3

โรงพยาบาลรายงานผู้ป่วย
ให้ ทีมสอบสวนโรค/รพ.สต.ทราบ ภายใน 3 ชั่วโมง

3

ทีมสอบสวนโรค/จนท.รพ.สต.
ลงสอบสวนโรคเบื้องต้น ภายใน 3 ชั่วโมง
(วัดสเปรย์บ้านผู้ป่วย)

1

ผู้นำชุมชน/จนท./อปท.
พ่นเคมีควบคุมโรคและกำจัดลูกน้ำ ภายใน 1 วัน

มาตรการควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชน : มาตรการ 3-3-1-7-14-21-28

กรณีพบผู้ป่วยรายแรกๆ ของหมู่บ้าน ให้ควบคุมโรค โดยมีเป้าหมาย

- Day 7: ดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI และ CI ในรัศมี 100 เมตรจากบ้านผู้ป่วยเป็นศูนย์
- Day 14: HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 5
- Day 21 : HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 5 CI ของรพ./โรงเรียน/วัด/โรงแรม/โรงงาน ในตำบล=0

- รายงานผู้ป่วย 3 ชม.แรก

- กำจัดลูกน้ำ+ฉีดสเปรย์กระพือ

ในบ้านผู้ป่วย 3 ชม.ต่อมา

ดำเนินการซ้ำใน

รัศมี 100 เมตร

ดำเนินการใน

หมู่บ้านที่พบผู้ป่วย

Day
(นับจากวันที่พบผู้ป่วย)

0 1 3 7 14 21 28

กำจัดลูกน้ำ พ่นสารเคมี
รัศมี 100 เมตร โดย อปท.

- ดำเนินการในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย
- หากเกิดโรคหลายหมู่บ้านให้ดำเนินการทั้งตำบล



- กำจัดลูกน้ำทุก 7 วัน
- สสจ. ประเมิน HI CI ในตำบลที่ระบาดต่อเนื่อง

หมายเหตุ



- คงมาตรการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนทุก 7 วัน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
- คงมาตรการพ่นสารเคมีเสริมทุก 7 วันหากยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง
- ถ้าพบผู้ป่วยตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปใน 28 วันในกลุ่มบ้าน / หมู่บ้านเดียวกัน ให้พ่นสารเคมีทั้งกลุ่มบ้าน/หมู่บ้านนั้นๆ เพิ่มเติมจากรัศมี 100 เมตร

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จังหวัดน่าน

1-31 สิงหาคม 2565



อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก
(Hand Foot and Mouth Disease)
ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2565



สรุป ข้อเสนอแนะ และมาตรการ

(สรุป)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
พบว่า

ผู้ป่วย โรคมือ เท้า ปาก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในบางพื้นที่
ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด.) และ รร.ประถมศึกษา

(ข้อเสนอแนะ/มาตรการควบคุมโรค)

แยกเด็กป่วย : อย่างน้อย 5 - 7 วัน หรือ ตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

ห้องเรียน/ ศพด.-โรงเรียน : ปิดห้องเรียน เมื่อพบ 2 รายใน 1 สัปดาห์

: พิจารณาปิด ศพด.-โรงเรียนชั่วคราว เมื่อพบมากกว่า 1 ห้องเรียน


อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส (และ ทุกวัน หลังเปิดเรียนและไม่พบรายใหม่ ในเวลา 1 เดือน)

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค

คัดกรองเด็กป่วย (ก่อนขึ้นรถโรงเรียน หรือ ก่อนเข้าชั้นเรียน)

ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/สัปดาห์

สถานการณ์ Liver fluke จังหวัดน่าน 2565




ความชุกของการตรวจพบไข่หนอนพยาธิใบไม้ตับ (OV)
ในอุจจาระ พื้นที่ จ.น่าน ปี 2565 รายอำเภอ

		ตรวจ	พบ OV	% พบ OV
แม่จริม	1	3872	978	25.26
สันติสุข	5	149	16	10.74
ภูเพียง	3	551	63	11.43
เมืองน่าน		2291	108	4.71
เวียงสา		622	60	9.65
บ้านหลวง	6	396	42	10.61
ท่าวังผา		3155	263	8.34
นาหมื่น		1289	108	8.38
น่าน้อย		1278	52	4.07
ปัว	2	2232	260	11.65
ทุ่งช้าง	4	475	52	10.95
เขียงกลาง		1514	145	9.58
สองแคว		63	0	0.00

สรุป ข้อเสนอแนะ และมาตรการ

อัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วย LIVER FLUKE จ.น่าน ปี 2565 จำแนกรายอำเภอ (ในระบบ รว. 506) ณ 31 สิงหาคม 2565



(สรุป)

เร่งรัดบันทึกข้อมูลผู้ตรวจพบไข่พยาธิ OV ตามระบบ และส่งเข้าระบบ รว.506
(อ.แม่จริม/ อ.บ้านหลวง/ อ.ปัว/ อ.สันติสุข/ องบ่อเกลือ/ อ.เฉลิมพระเกียรติ)

(ข้อเสนอแนะ/มาตรการควบคุมโรค)


ติดตามให้การรักษาผู้ติดเชื้อ

สะท้อน-คืนข้อมูล สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบของโรคพยาธิใบไม้ตับ ให้ชุมชน-อปท.
เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูล


ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ

1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2565

ร้อยละ



ร้อยละ



ควบคุม-กำกับ-ติดตาม : ความครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล (ระบบรายงาน 506)

สถานการณ์ โรคฝีดาษวานร

(monkeypox)



UPDATE 28/08/65

รายงาน

ผู้ป่วยยืนยัน
ทั่วโลก

48,331

ราย

ผู้ป่วยยืนยัน
ในไทย

7

ราย

สรุป มติ ข้อสั่งการ PHEOC กระทรวงสาธารณสุข กรณี Monkeypox

(ข้อสั่งการ)

เน้นเฝ้าระวัง-คัดกรองโรค ในกลุ่มผู้รับบริการ **Clinic STD**
สื่อสารบุคลากร เกี่ยวกับกลุ่มอาการที่น่าสงสัย และลักษณะผื่นที่น่าเป็นไปได้
เฝ้าระวังในกลุ่ม**ผู้เดินทางเข้าประเทศ**